

Március végén és április elején – a klímai normáknál magasabb hőmérsékletek aktiválják a vegetációs folyamatokat a téli gabonafélékben és a többéves ültetvényekben.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 31.03.2024 Брой: 3/2024



A március második felében tapasztalható átlag feletti hőmérsékletek aktiválták a növekedési folyamatokat a téli gabonafélékben és a többéves ültetvényekben. Az ország déli régióinak egyes területein (Sandanszki, Plovdiv, Pazardzsik, Haszkóvo, Ljubimec) a búza- és árpaállomány egy része a szokásos időkeretnél korábban lépett a szárhajtás fejlődési stádiumába.

A következő hétnapos időszakban a mezőgazdasági növények fejlődése a klimatikus normák feletti hőmérsékletek mellett fog folytatódni. Az időszak alatt a búzában a vetésterületeken az elszárugásról a szárhajtásra való átmenet figyelhető meg, valamint a szárhajtás stádiuma a Duna-menti síkság és a déli régiók állományaiban.

A csonthéjas gyümölcsfajoknál a virágzás a kritikus minimumhőmérsékletek kockázata nélkül fog folytatódni. A almatermésű gyümölcsfajoknál a virágrügy-stádium lesz túlsúlyban. Ebben a stádiumban kell végezni a gazdaságilag jelentős betegségek – az alma és körte varasodása, valamint az alma lisztharmat – elleni kezeléseket.

A szőlőben a rügyduzzadás és a rügybontakozás (Bazovec, Pleven, Szliven) stádiumai következnek be, amelyek alatt a exoriose (szőlőfekélyesedés) betegség elleni kezeléseket végzik.

A növényvédő permetezések végzésére kedvezőbb feltételek az időszak első felében állnak fenn.

Április első évtizedének közepéig jelentős csapadékra nem számíthatunk, és a feltételek lehetővé teszik a talajművelést és a közepesen korai tavaszi növények vetését. A következő időszak egybeesik a napraforgó vetés agrotechnikai időkeretével a Duna-menti síkságon.

Forrás: OMSZ