

Április végén és május elején – változékony időjárás, fagyok kialakulásának és a mezőgazdasági termények károsodásának kockázatával.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.04.2024 Брой: 4/2024



A következő hét napos időszakban a mezőgazdasági növények vegetációs folyamatai mérsékelt ütemben fognak haladni, az átlagos napi hőmérsékletek a klímatis normák körül alakulnak. Az április harmadik tíz napos időszakában az ország szántóföldi régióiban lehullott gazdaságilag jelentős mennyiségű csapadék javította a kukorica és napraforgó kezdeti fejlődési fázisainak, valamint az őszi gabonafélék vegetációjának feltételeit.

Plovdiv, Sztara Zagora és Szliven egyes részein jégesők fordultak elő, amelyek a termés nagy részét elpusztították. Szliven Banya falujában az összes rózsautletvényt elpusztította a jég, és a szőlőültetvényeket is érte kár.

A búza és árpa esetében a következő fázisok fognak bekövetkezni: szárba szökés az ország nyugati felének és a Duna-síkság középső részének egyes növényeinél; kalászás és a kalászás kezdete Bulgária keleti és déli részeinek egyes területein – Targoviste, Szilisztra, Karnobat, Kazanlak, Plovdiv és Pazardzsik agrárállomásokon. A kukorica és napraforgó esetében a kelés és a levélképződés kezdete várható, a vetés idejétől függően.

A szőlőnél a levélképződés (1-3 levél) és a fűtelválasztás lesz megfigyelhető.

Az őszi gabonaféléknél a szárba szökés és kalászás fázisaiban a növényeket a mezei gabonakukac és a poloskaszagú gabonafutrinka károsítja. A növényeket a lisztharmat kialakulására is ellenőrizni kell.

Gyümölcsfajoknál virágzás után folytatódnak a csonthéjasok korai barnarothadása, a varasodás és a lisztharmat elleni kezelések az almatermésűeknél. A szőlőnél a növényvédelmi permetezések a kultúra peronoszpóra és lisztharmat elleni, valamint a sárga szőlőtakácsatka káros tevékenysége elleni védelmét célozzák.

Az előre jelzett instabil, csapadékos időjárás átmenetileg korlátozza az agrotechnikai tevékenységek elvégzésének lehetőségeit. Az időszak elején Nyugat-Bulgária magasabban fekvő síkságain továbbra is fennáll a fagy kialakulásának és a mezőgazdasági növények károsodásának valószínűsége.

Forrás NIMH