

Május – instabil időjárás és kedvező feltételek a gombás fertőzések szintjének emelkedéséhez

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.05.2024 Брой: 5/2024



Május első tíz napos időszakának legtöbb napján az agrometeorológiai feltételeket instabil, gyakori csapadékkal járó időjárás határozza meg, ami kedvez a gombás betegségek fertőzési hátterének növekedéséhez. A mezőgazdasági növények vegetatív folyamatai mérsékelt ütemben, a klimatikus normákhoz közeli hőmérsékleten zajlanak majd.

Az április második felében a legtöbb szántóföldi területen lehullott, 30-50 l/m² közötti csapadék hozzájárult az őszi vetések talajnedvesség-hiányának leküzdéséhez, kivéve Északnyugat-Bulgária egyes helyeit. A május közepéig előre jelzett csapadék viszonylag jó nedvességtartalékokat tart fenn az 50 cm-es talajrétegben, a

szántóföldi vízkapacitás (FC) 75%-a felett. Az első tíz napos időszakban a búzavetések kalászhányás – kezdeti és tömeges – fázisán mennek keresztül. A repce virágzik majd.

A szezonális agrotechnikai tevékenységek és növényvédelmi permetezések elvégzésére alkalmasabb feltételek az első tíz napos időszak közepén lesznek, amikor viszonylag száraz időjárás várható.



A gabonafutrinka komolyan veszélyezteti a búza termés hozamát

Ebben az időszakban ellenőrizni kell az őszi gabonavetéseket a kártevő gabonapoloska és a gabonafutrinka jelenléte és sűrűsége szempontjából.



A szőlőn a virágfürtök károsodását a szőlőmoly első nemzedékének hernyói okozzák. Az gazdasági kártételi küszöb (EDT) elérésekor, ami borfajtáknál 6-8 hernyó/100 fürt, csemegeaszőlő-fajtáknál pedig 4-6 hernyó/100 fürt, az időben történő kezelés kötelező.

A hónap közepéig tartó instabil időjárás után május második felében változás várható az agrometeorológiai feltételekben. Az átlagos napi hőmérsékletek emelkedése és az őszi vetések, valamint a vetett tavaszi növények vegetatív folyamatainak gyorsulása várható. Ebben az időszakban a napraforgóban és a kukoricában megindul a levélfejlődés.

A május végére várható csapadék biztosítja az őszi gabonafélék megnövekedett talajnedvesség-igényét. Ebben az időszakban a búza tejes érési szakaszban lesz. Az agrotechnikai határidőn belül vetett napraforgó vetéseknél virágzatképződés lesz megfigyelhető. Májusban továbbra is fennáll a jégesők lehetősége és a mezőgazdasági növények károsodásának kockázata. Az jégeső által érintett évelő és zöldségnövények esetében réztartalmú gombaölő szerekkel történő kezelés javasolt a másodlagos kórokozó fertőzések kockázatának korlátozására.

Alkalmasabb feltételek a növényvédelmi permetezések elvégzésére számos betegség ellen – korai barna rothadás, lyukacsos levélbetegség, almafélek varasodása, zöldségnövények és szőlő peronoszpóra, búza fuzáriumos kalászfertőzése – az első tíz napos időszak végén, a második elején és végén, valamint a május harmadik tíz napos időszakának legtöbb napján állnak rendelkezésre.

Forrás: NIMH