

Agrotechnikai tevékenységek a gyümölcsösben májusban

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.05.2024 *Брой:* 5/2024



Május első tíz napjának legtöbb napján az agrometeorológiai viszonyokat instabil, gyakori csapadékkal járó időjárás határozza meg, ami feltételeket teremt a gombabetegségek fertőző hátterének növekedéséhez. A mezőgazdasági növények vegetatív folyamatai mérsékelt ütemben zajlanak a klímanormákhoz közeli hőmérsékleten.

A hónap közepéig tartó instabil időjárás után május második felében az agrometeorológiai viszonyok változása várható. Az átlagos napi hőmérsékletek emelkedése várható. Május végén csapadék várható. Egész hónapban fennáll a jégeső lehetősége és a mezőgazdasági növények károsodásának kockázata.

Gyümölcsiskolákban

Az iskolákban ellenőrzik az oltott rügyek megfelelő fejlődését. Szükség esetén elvégzik az alanyról kihajtott hajtások újrasarjaztatását.

Ha fennáll a gyűrűzés veszélye, meglazítják a tavasszal újraoltott alanyokon lévő kötéseket.

Magágyakat, anyatöveket és iskolákat művelnek. Szükség esetén a magágyakban lévő növényeket ritkítják.

Gyümölcsültetvényeken

A virágzás végén a méhkasokat másik helyre – legalább 5 km távolságra – szállítják.



Az újonnan ültetett, kehely vagy javított kehely koronájú őszibarackosokban alakító metszést végeznek. Gondoskodnak az újonnan telepített ültetvényekben lévő fák megfelelő gyökeresedéséről és fejlődéséről – kapálás, sarjzás, szükség esetén öntözés. A fiatal, sűrű ültetvényekben a fákat huzalszerkezethez kötik. Az erős két- és hároméves ágakat meghajlítják és a huzalokhoz kötik növekedési erejük csökkentése érdekében. Fiatal – 2 és 3 éves – ültetvényekben a vezérágon – központi ágon – lévő gyümölcskötések egy részét eltávolítják. Az őszibarack gyümölcsritkítási munkálatai folytatódnak. A gyümölcs hullás végleges befejezése után az ültetvényeket öntözik. A zöldtrágyanövényekből származó szerves anyagot beszántják.

A talajt gyommentesen tartják és rendszeres sekély talajműveléssel, kultivátorral vagy boronával lazítják. A hónap végén a termő fákat 15-20 kg/dka ammónium-nitráttal vagy ugyanennyi más nitrogén műtrágyával trágyázzák.

A korai cseresznyefajták betakarítása folytatódik.

Eperültetvényeken



Folytatódik a hűtőszekrényben tárolt eperpalánták tavaszi-nyári ültetése. Ültetés után ködöntözést alkalmaznak. Az áprilisban ültetett területeket gyomlálják. Magasabb régiókban a hónap végéig szalmát fektetnek a virágszárak alá.

A betakarítás folytatódik. Ha a gyümölcsöket hosszabb távolságra szállítják, kissé korábban is betakaríthatók. Aszály esetén a gyümölcsérés idején ködöntözés vagy gravitációs öntözés szükséges.

Málnaültetvényeken

Rendszeres talajművelést végeznek. Egyes fajták hajtásait a támasztószerkezethez kötik, míg más fajták esetében gondoskodnak arról, hogy ne lógnak be a sorok közé.



Virágzás idején ajánlott 10 dka-nként két méhcsaládot biztosítani.

Feketeribizli-ültetvényeken



A gondozás folytatódik – a gyökeresedési területek művelése és öntözése. Az elgyengült és felesleges gyökérsarjakat eltávolítják. Aszály esetén bőséges öntözést végeznek. Megkezdődik a feketeribizli gyümölcsök betakarításának megszervezése.

Más növények ültetvényein

A citrom alanyokat szemzéssel oltják. A datolyaszilva oltása folytatódik. A talajfelszínt gyommentesen tartják és rendszeres sekély talajműveléssel lazítják. Gyakori és rendszeres öntözés biztosított a második tíz napos időszakig.



Az *Actinidia chinensis* szabadföldi ültetése folytatódik. Ültetés után öntözik. Az *Actinidia* indáit rendszeresen segédtámasztó ágakhoz kötik. A szár nem tekeredhet a támasztó ág köré, és az azon lévő oldalhajtásokat eltávolítják. 10 dka *Actinidia* ültetvényre három méhcsaládot biztosítanak.