

Június elején – a meleg és nedvesség kedvező együttállása esetén – a tavaszi vetésű növények vegetációja zajlani fog.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.06.2024 Брой: 6/2024



Június első hetében a mezőgazdasági növények fejlődése felgyorsult ütemben zajlik a megszokottnál magasabb hőmérsékleti körülmények között és nagyon jó talajnedvesség-tartalékkal – a májusi jelentős esőzések miatt, amelyek az ország nagy részén meghaladták a havi normát, kivéve az északkeleti és délnyugati régiók egyes területeit.

Ebben az időszakban a magasabb fekvésű területeken a téli gabonafélékben a szemkitelítődés zajlik. Az alföldi régiókban a búza a következő fázisokon megy keresztül: tejes érés, viaszérésbe való átmenet és viaszérés a

délkeleti régiókban lévő növényeknél. A déli régiókban az árpa esetében a viaszérés dominál.

Június elején, a hő és nedvesség kedvező kombinációja mellett, a tavaszi vetésű növények vegetációja folytatódik. Levélképződés figyelhető meg a kukoricán és a napraforgón. Az agrotechnikai időszakon belül vetett napraforgó (Plovdiv, Haskovo, Lyubimets) esetében virágzatképződés következik be.

Az időszakban várható csapadék fenntartja a kedvező feltételeket a gombabetegségek kialakulásához: peronoszpóra a zöldségnövényeken; késői barna rothadás, varasodás és lisztharmat a gyümölcsfákon; peronoszpóra és lisztharmat a szőlőn, ami időben történő növényvédelmet igényel az esőzések megszűnése után.

A jégeső megnövekedett valószínűsége, valamint a termés megdőlésének és az álló gabonatermés károsodásának kockázata várható az időszak utolsó napjaiban.

Forrás NIMH