


Június – a változékony, csapadékos időjárástól az átlag feletti hőségig

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.06.2024 Брой: 6/2024



Júniusban az agrometeorológiai feltételeket a csapadékos, instabil időjárás határozza meg, a havi normánál magasabb vagy azzal megegyező mennyiségű csapadékkal, ami jó és nagyon jó nedvességtartalékokat tart fenn az 50 cm-es és 100 cm-es talajrétegben – az FC (talaj vízkapacitása) 75-80%-a felett. Alacsonyabb talajnedvesség-tartalékok várhatók a szélső északkeleti és délnyugati régiók egyes részein (Razgrad, Rusze, Szilisztra, Szandanszki), ahol a májusi csapadék a havi norma alatt maradt.

Június elején a mezőgazdasági növények fejlődése gyorsított ütemben halad, a normálnál magasabb hőmérsékleti viszonyok között. A búza és árpa tavaszi vegetációja során tapasztalt magas hőmérséklet miatt fejlődésük a szokásosnál korábban befejeződik. Június első tíz napjában az árpa esetében a tarlóterületeken

tömeges viaszérés várható, a tíz napos időszak végén pedig a teljes érés. A búza esetében ebben az időszakban tejes, átmeneti, majd viaszérés következik be.

A második tíz napos időszak legtöbb napján az agrometeorológiai feltételeket az időszezonra jellemző, szokásoshoz közeli hőmérsékletek határozzák meg. A tíz napos időszak közepén a magas fekvésű területeken a téli gabonanövények érési fázisba lépnek. A kukorica esetében levélképződés, a napraforgó esetében pedig virágzatképződés dominál.

A június 7-13 közötti időszak nagy részében az agrometeorológiai feltételeket meleg időjárás határozza meg, helyi csapadék és jégeső valószínűségével. A maximális hőmérséklet az egész időszakban meghaladja a 30°C-ot, a Trák-síkságon elérheti a 38°C-ot, ami előfeltétele a hőstressznek és a termesztett növények normális fejlődési feltételeinek romlásának vegetatív és generatív stádiumukban.

Június második tíz napos időszakának elején a kukorica esetében levélképződés; az optimális agrár időszakban vetett napraforgóknál virágzatképződés; a hüvelyes növényeknél (bab, szójabab) bimbózás és virágzás következik be. Az árpa esetében a tarlóterületeken a viaszérés dominál. A búza esetében tömeges tejes és viaszérés következik be. A repce esetében az érési fázis figyelhető meg.

A június harmadik tíz napos időszakában előre jelzett normálisnál magasabb hőmérsékleti viszonyok felgyorsítják a tavaszi növények vegetációját, és némelyikük fejlődésük reprodukív fázisába lép. Az optimális agrár időszakban vetett napraforgóknál a virágzási fázis kezdete, a korábbi kukoricahibrideknél pedig a címerhányás és a porzóselyem-hullás figyelhető meg. Ebben az időszakban 35-36°C-ig terjedő maximális hőmérsékletek várhatók, ami negatívan befolyásolja a zöldségnövények virágzását és megtermékenyülését.

Júniusban az előre jelzett gyakori csapadék előfeltétele a gombás betegségek kialakulásának: gyümölcsfákon késői barna rothadás, varasodás és lisztharmat; zöldségnövényeken levélfoltosságok; szőlőn peronoszpóra, lisztharmat és szürkepenész. Kedvezőbb feltételek teremtnének a növényvédelmi permetezések elvégzésére a hónap második felében.

! A magas hőmérséklet és az alacsony légköri páratartalom korlátozza a növényvédelmi intézkedések végrehajtásának lehetőségeit, és megnehezíti a szántóföldi munkát.

