

Agrotechnikai tevékenységek a gyümölcsösben júliusban

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.07.2024 *Брой:* 7/2024



Július második és harmadik szakaszának legtöbb napján viszonylag száraz és nagyon forró idő várható, maximum hőmérsékletekkel 35-40⁰C között. A júliusra előrejelzett magas hőmérsékletek és a viszonylag száraz időjárás korlátozni fogja a gombabetegségek fejlődését a többéves ültetvényekben, a lisztharmat kivételével. A havi normát körülvevő és az alatti várható csapadék fokozott öntözési rendszer bevezetését fogja megkövetelni.

Gyümölcskertészeti csemetekben

A vetőágyakat rendszeresen öntözik és művelik, hogy a lehető legmagasabb százaléku szabványos alanyanyagot biztosítsák. Az anyaültetvényeket öntözik, és szükség esetén felhalmozzák.

A rügyezett növények jó fejlődésének feltételeinek biztosítása érdekében a másodéves csemetékben szükség esetén rügyeltetést végeznek. Rendszeres művelést és öntözést végeznek, különösen a körte csemetékben.

Az elsőéves csemetékben megkezdődik az alanyok rügyezése, és azokban, ahol a rügyek nem fogadtak el, újrarügyezést végeznek. A rügyezést követően körülbelül két héttel a kötéseket ellenőrzik. A kérget bevágókat meglazítják.

Gyümölcsösökben

Folytatódnak a vázágak hajlítása a pálmafa formálásánál.

Öntözéssel a talajnedvességet a mezői vízkapacitás 70%-a felett tartják.

Lemezes ekével, kultivátorral, rotációs kapaéssel és eltolható szekcióval ellátott rotációs kapaéssel a sorok között és a sorokon belül a talajfelszínt művelt és gyommentes állapotban tartják.



Folytatódik a cseresznye és meggy betakarítása, és megkezdődik a kajszi és barack tömeges betakarítása is.

Eper ültetvényekben

Folytatódik az újonnan létesített eper ültetvények öntözésének gondozása, különösen a júniusban ültetetteké. Az alacsonyabb és melegebb régiókban, ahol a gyümölcsbetakarítás befejeződött, a szalmát összegyűjtik, eltávolítják és elégetik.



A magasabb és hűvösebb helyeken folytatódik a gyümölcsök betakarítása.

A szalma eltávolítása után az ültetvényeket öntözik és művelik, miután előzőleg 10-12 kg ammónium-nitráttal trágyáztak meg holdanként.

A ültetőanyag előállítására szánt anyaültetvényeket öntözik, 15-20 kg ammónium-nitráttal trágyázzák meg holdanként és kapálják. Azokban az ültetvényekben, ahonnan nem vesznek ültetőanyagot, a kúszó hajtásokat kivágják.

Új területeket jelölnek ki eper ültetvények számára, és előkészítik őket őszi ültetésre szabadföldön. A mélyművelés előtt a területet 2-4 t istállótrágyával, 60-80 kg szuperfoszfáttal és 20-30 kg kálium-szulfáttal trágyázzák meg holdanként.

Málna ültetvényekben

Folytatódik az új ültetvények öntözésének és művelésének gondozása. A termő ültetvényeket öntözik és művelik. Az öntözési norma $50-60 \text{ dm}^3$ holdanként.



A gyümölcsök tömeges betakarítását végzik.

Gondoskodnak a málna anyaültetvényekről – öntözés és művelés, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű ültetőanyagot – sarjakat biztosítsanak.

Az ültetvényeket ellenőrzik, más fajták eltérő típusait eltávolítják, valamint a régi, termő vesszőket kivágják, összegyűjtik és elégetik.

Feketeribizli ültetvényekben

Folytatódik a gyökeresedő ágyások gondozása. A talajt öntözik és művelik, és a fiatal és termő ültetvényekben nem engedik meg a gyomfertőzést.

Az ültetvényeket nitrogénnel trágyázzák (az éves adag 1/3-ával).

A gyümölcsök tömeges betakarítását végzik. A betakarítás során más fajták eltérő típusait későbbi kiirtás céljából megjelölik, valamint a beteg és gyenge növényeket. A betakarítás után az eltört, alulfejtett és felesleges hajtásokat eltávolítják.

Egyéb növényekkel telepített ültetvényekben

Megjelölik a kívánt fügefajtákat és formákat dugványok nyeréséhez. Dugványokat vesznek aktinídiából, babérből, aróniából, homoktövisből és gránátalmafaból gyökeresedés céljából mesterséges ködöléssel ellátott üvegházban. A dugványokat előkészítik és indolvajsav oldattal kezelik 5 másodpercig. Két rész perlit és egy rész tőzeg talajkeverékben gyökeresednek mesterséges ködöléssel ellátott üvegházakban.

Megkezdődik a kaukázusi datolya alanyok datolyafajtákkal való rügyezése, valamint az aktinídia csemeték művelt fajtákkal való rügyezése.

Folytatódik az aktinídia indáinak a drótkosárhoz kötése. Az aktinídia nyári metszését végzik. A drótkosár már ültetéskor be van szerelve, és a drótokat 1-1,20 m és 1,80-2 m magasra emelik a talajfelszín felett.

A jujubát és a pisztáciát rügyezik.

Fügegyümölcsöket takarnak be, és a hónap végé felé megkezdődik a homoktövis és arónia gyümölcsseinek betakarítása.