

Növényvédelmi teendők a gyümölcsösben júliusban

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 09.07.2024 *Брой:* 7/2024



Kedvezőbb körülmények a növényvédő permetezések (a gyümölcsösökben a gyümölcsmolyok második nemzedéke, atkák ellen) végrehajtására az első hónap felének második felében, a második tíz nap legtöbb napján és a hónap végén állnak majd elő. A kezeléseket a nap hűvösebb óráiban kell végezni. Megmarad a helyi intenzív időjárási események és a jégeső, valamint az ebből eredő mezőgazdasági növények károsodásának valószínűsége. Jégeső után réz tartalmú készítménnyel történik a kezelés.

Gyümölcstenyészetekben

Az alma és barack tenyészeteket, valamint a klón alma alanyanyagokat az anyaültvényekben lisztharmat ellen 8-10 naponként permetezik a növekedés leállásáig. A permetezéshez kén alapú készítményt - Sulphur WG 600 g/da, Solfo 80 WG – 750 g/da vagy az egyik készítményt – Systhane 20 EW – 0.03%, Luna Experience – 50–75 ml/da, Flint Max 75 WG – 0.02% használnak.

Folytatódik a levélfoltosság (cylindrosporium) elleni védekezés. A cseresznye és meggy tenyészeteket és a mahaleb cseresznye palántákkal rendelkező magágyakat Syllit 544 SC – 125 ml/da készítménnyel permetezik.

A laposfejű almabarkó által megtámadott és kiszáradt fákat kiássák és elégetik.



Összefonós araszoló hernyói

Az észlelt összefonós araszoló fészkeket összegyűjtik és elégetik.

A szilva tenyészeteket a szilvarozsda ellen Signum – 45 g/da készítménnyel permetezik.

A levéltetvek és a levélevő hernyók ellen piretroid rovarölővel – Decis 100 EC (7.5–12.5 ml/da), Sumicidin 5 EC (0.02%), Aphicar 100 EC (15 ml/da), Efcimetrin 10 EC (15 ml/da) végeznek kezelést.



*Júliusban azon **almaültetvényekben**, ahol a varasodás fertőzést nem engedtek meg, a betegség elleni permetezést beszüntetik. Fertőzés jelenlétében a leveleken és gyümölcsökön, valamint gyakori záporok mellett fennáll a késői fertőzések és a gyümölcsfertőzöttség mértékének növekedésének kockázata, ami ebben az esetben ebben az időszakban is kezelést igényel.*

Gyümölcsültetvényekben

Az almaültetvényeket a NÉBIH jelzése alapján a almamoly (második nemzedék) ellen az egyik készítménnyel – Carpovirusine (100 ml/da), Madex Top (10 ml/da), Dipel DF (50–150 g/da), Sineis 480 SC (20–37.5 ml/da), Delegate 250 WG (30 g/da), Avant 150 EC (33.3 ml/da), Deca EC (30 ml/da), Decline 2.5 EC (30 ml/da), Lamdex Extra (60–100 g/da) valamint a lisztharmat és atkák ellen kén alapú készítménnyel – Sulphur WG 600 g/da, Solfo 80 WG – 750 g/da vagy az egyik készítménnyel – Systhane 20 EW – 0.03%, Luna Experience – 50–75 ml/da, Flint Max 75 WG – 0.02% és az egyik készítménnyel – Valmec (60–96 ml/da), Apollo 50 SC (40 ml/da), Nissorun 5 EC (0.05%) permetezik.



Almamoly

Az almamoly második nemzedéke elleni második permetezést az első után 12-14 nappal végezzük az egyik készítménnyel – Carpovirusine (100 ml/da), Madex Top (10 ml/da), Dipel DF (50–150 g/da), Sineis 480 SC (20–37.5 ml/da), Delegate 250 WG (30 g/da), Avant 150 EC (33.3 ml/da), Deca EC (30 ml/da), Decline 2.5 EC (30 ml/da), Lamdex Extra (60–100 g/da), a lisztharmat ellen kén alapú készítménnyel – Sulphur WG 600 g/da, Solfo 80 WG – 750 g/da vagy az egyik készítménnyel – Systhane 20 EW – 0.03%, Luna Experience – 50–75 ml/da, Flint Max 75 WG – 0.02%, valamint a levélaknázó moly ellen piretroid rovarölővel – Decis 100 EC (7.5–12.5 ml/da), Sumicidin 5 EC (0.02%), Aphicar 100 EC (15 ml/da), Efcimetrin 10 EC (15 ml/da).

A barackültetvényeket a lisztharmat ellen kén alapú készítménnyel – Sulphur WG 600 g/da, Solfo 80 WG – 750 g/da permetezik.

A gyümölcsültetvények sorai közötti gyomokat Typhoon SL vagy más glifozát alapú készítménnyel – 400–1200 ml/da permetezik.

Nem mérgező hullámos kartondból készült csapdázó öveket helyeznek el az almamoly és a szilvamoly hernyóinak gyűjtésére, amelyek szükségesek fejlődésük következő évi monitorozásához. Minden fajból 500-1000 hernyót gyűjtenek.

Kereteket – izolátorokat (5 erősen fertőzött fa alá) helyeznek el a levélaknázó moly bábjainak megőrzésére, amelyek szükségesek fejlődésének következő évi monitorozásához.

Az almaültetvényeket az almamoly ellen (a második nemzedék harmadik permetezése), a levélaknázó moly és a lisztharmat ellen rendre az egyik készítménnyel – Carpovirusine (100 ml/da), Madex Top (10 ml/da), Dipel DF (50–150 g/da), Sineis 480 SC (20–37.5 ml/da), Delegate 250 WG (30 g/da), Avant 150 EC (33.3 ml/da), Deca EC (30 ml/da), Decline 2.5 EC (30 ml/da), Lamdex Extra (60–100 g/da), piretroid rovarölővel – Decis 100 EC (7.5–12.5 ml/da), Sumicidin 5 EC (0.02%), Aphicar 100 EC (15 ml/da), Efcimetrin 10 EC (15 ml/da) és kén alapú készítménnyel – Sulphur WG 600 g/da, Solfo 80 WG – 750 g/da vagy az egyik készítménnyel – Systhane 20 EW – 0.03%, Luna Experience – 50–75 ml/da, Flint Max 75 WG – 0.02% permetezik.

A körteültetvényeket a körte levéltetű (harmadik nemzedék), a körte csipkésposloska, a körtemoly stb. ellen piretroid rovarölővel – Decis 100 EC (7.5–12.5 ml/da), Sumicidin 5 EC (0.02%), Aphicar 100 EC (15 ml/da), Efcimetrin 10 EC (15 ml/da) kezelik.

A szilvaültetvényeket a szilvamoly ellen (a második nemzedék második permetezése) az egyik készítménnyel – Carpovirusine (100 ml/da), Madex Top (10 ml/da), Dipel DF (50–150 g/da), Sineis 480 SC (20–37.5 ml/da), Delegate 250 WG (30 g/da), Avant 150 EC (33.3 ml/da), Deca EC (30 ml/da), Decline 2.5 EC (30 ml/da), Lamdex Extra (60–100 g/da) kezelik.

Eperültetvényekben

Az eperültetvényeket felméréssel vizsgálják az eperatka kimutatására; permetezést az egyik készítménnyel – Valmec (60–96 ml/da), Apollo 50 SC (40 ml/da), Nissorun 5 EC (0.05%) végeznek.



Gyümölcsfa vörösatka

Feketeribizli ültetvényekben

A gyümölcsök betakarítása után az ültetvényeket az atkafajok ellen az egyik készítménnyel – Valmec (60–96 ml/da), Apollo 50 SC (40 ml/da), Nissorun 5 EC (0.05%) permetezik.

A sorok közötti gyomokat Typhoon SL vagy más glifozát alapú készítménnyel – 400–1200 ml/da permetezik.

Gyomtérképezést végeznek az összes gyümölcsültetvényben, beleértve a feketeribizli ültetvényeket is.