

A késői mezőgazdasági növények fejlődésének korlátozó tényezője augusztusban továbbra is a talajnedvesség hiánya.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.08.2024 Брой: 8/2024



A rendkívül magas júliusi hőmérsékletek és a súlyosbodó aszály helyenként helyrehozhatatlan károkat okoztak a kukoricának és a napraforgónak az ország középső, északkeleti és déli régióiban.

Augusztusban az agrometeorológiai feltételeket a klímanorma körüli és feletti hőmérsékletek fogják meghatározni. A késői mezőgazdasági növények fejlődésére a hónap során továbbra is a talajnedvesség hiánya lesz a korlátozó tényező. A július végi csapadék egyenetlenül oszlott meg, és az ország nagy részén későn és rendkívül elégtelenül érkezett ahhoz, hogy megszüntesse a késői növények nedvességhiányát. Nyugat- és déli

régiók egy részében a talaj 50 és 100 cm-es rétegeiben a nedvességtartalék teljesen kimerült. Kivételt képeznek Kelet-Bulgária egyes helyei, ahol július végén 30-40 l/m² feletti csapadékot (Razgrad, Sumen, Ruse, Burgasz, Chirpan) jegyeztek fel, amely megnedvesítette a felső talajrétegeket.

A hónap első felében várható csapadék Kelet-Bulgária egyes helyein nem fogja jelentősen megváltoztatni a talajnedvességet, ami fokozott öntözési rend alkalmazását fogja megkövetelni az ország teljes mezőgazdasági övezetében.



Augusztusban folytatódik a **atkák** károsító tevékenysége, amely a paradicsomot, paprikát, padlizsánt, uborkát, tökféléket, póréhagymát, gombát, zellert, petrezselymet és másokat károsítja.

Augusztus első tíz napjában az ország keleti régióiban várhatóan javulnak a feltételek a szezonális talajművelés végzéséhez. Az időszak közepén rövid távú hőmérséklet-csökkenés és kedvezőbb feltételek várhatók a növényvédő permetezések végrehajtásához a zöldségfélékben és a gyümölcsösökben – lisztharmat, atka és almamoly ellen.

Augusztus napjainak nagy részén a viszonylag száraz időjárás miatt szükségessé válik a fokozott öntözési normák alkalmazása a második termésű növényeknél és a késői kukoricahibrideknél, amelyekben a szemképződés és -töltődés zajlik. Fokozott öntözési normákra szükség lesz a késői gyümölcsfajtáknál és a szőlőnél is, amelyek a termésnövekedés fázisában vannak.

Krumov Szimeon egyetemi docens a Mezőgazdasági Intézettől – Kjusztendil a termésnövekedés és a rügydifferenciálódás alatti öntözést javasolja az agrozone.bg-nak. A agronómusoknak szigorúan figyelniük kell a fákat, és ha észlelik a gyümölcsfákon a hőség által okozott levelek sodródását, azonnali intézkedéseket kell hozniuk. Ebben az esetben a ültetvények öntözése elengedhetetlen. A gravitációs vízellátáson kívül a csepegtető öntözés és a permetező öntözés is alkalmas az élő gyümölcsfajok számára.

A szőlő öntözése

A szőlő viszonylag aszálytűrő faj, de az aszály komolyan érinti. Ezért célszerű követni a Pleveni Szőlészeti és Borászati Intézet szakembereinek tanácsait arról, hogy mikor kell öntözni a szőlőültetvényeket.



Idén augusztusban, a szokásos időpontoknál korábban fejeződnek be a késői tavaszi növények fejlődési fázisai. A normál feletti hőmérsékleti viszonyok és a talajnedvesség hiánya a nyár első felében a kukorica és a napraforgó fejlődésének fázisai közötti időt rövidítette meg. Augusztus elején a Duna-menti síkságon és a déli régiókban a napraforgó érési fázisa figyelhető meg. Az első tíz napban a korai kukoricahibridek fejezik be fejlődésüket, a középkorai hibridekben pedig a tejérettség fázisa lesz megfigyelhető. A középkéső kukoricahibridek a hónap harmadik tíz napján lépnek a viaszérettség fázisába.

Az augusztusi meteorológiai viszonyok korlátozzák a gombabetegségek terjedését, kivéve a lisztharmatot a zöldségfélékben, gyümölcsfákban és szőlőben. A hónap során a késői gyümölcsfajtáknál nem szabad alábecsülni az almamoly utolsó nemzedékének károsító tevékenységét. Szőlőtermő területeken figyelemmel kell kísérni a szőlőmoly harmadik nemzedékének lárváinak megjelenését és sűrűségét.

Az augusztusi növényvédő permetezéseket a nap hűvösebb óráiban kell végezni, a betakarítás előtti várakozási idővel rendelkező, a növények érési idejéhez megfelelő szerekkel.

Forrás: NIMH