

Agrotechnikai tevékenységek a gyümölcsösben augusztusban

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 05.08.2024 *Брой:* 8/2024



Augusztusban a hajtásnövekedés befejeződött. Az őszi alma-, körte- és barackfajták termései intenzíven növekednek, és párhuzamosan zajlik a termőrügyek differenciálódásának folyamata. A fákat tartalék tápanyagokkal látják el.


A hónap agrometeorológiai feltételeit a klímanorma körüli és feletti hőmérsékletek fogják meghatározni. A növényfejlődés korlátozó tényezője a hónap során továbbra is a talajnedvesség hiánya marad. A július végi csapadék egyenetlenül oszlott meg, és az ország nagy részében későn és rendkívül elégtelenül érkezett a nedvességhiány enyhítésére. Nyugati és déli régiók egy részében a talaj 50 és 100 cm-es rétegeiben a nedvességtartalék teljesen kimerült. Kivételek léteznek Kelet-Bulgária egyes helyein, ahol július végén 30-

40 l/m² feletti csapadékot (Razgrad, Sumen, Ruse, Burgasz, Chirpan) jegyezték fel, amely megnedvesítette a felső talajrétegeket.

Augusztus napjainak nagy részén az előrejelzett viszonylag száraz időjárás megemelt öntözési normák alkalmazását fogja megkövetelni a késői gyümölcsfajtáknál.

Gyümölcscsemetekertekben

A magágyakat megművelik és öntözik.



Az elsőéves csemeteföldeken folytatódik az alanyok rügyezése

A másodéves csemeteföldeken, ha szükséges, végrehajtják az alanyok rügyezési pont alatti végső rügytisztítást.

A anyaültvényeket ellenőrzik, és minden eltérő típust kiirtanak. A hézagokat azonnal pótolják a fő fajta növényeivel.

Augusztus végéig lehet oltani alma-, körte-, barack- és cseresznyefákat. A hónap második és harmadik tíz napos időszakában megkezdődik a birs oltása.

A júliusban rügyezett alanyokat ellenőrzik, és ahol a oltvány és az alany közötti forrtatás jó, az összekötőzéseket eltávolítják.

Gyümölcsültvényekben

Figyelik a talajnedvességet, és szükség esetén öntöznek. Eső vagy öntözés után sekély talajművelést végeznek a képződött kéreg megtörésére.

Mechanikus gyomirtást végeznek a fasorokban és a sorok közötti terekben.



Dótermés

Folytatódik a barack, valamint a korai alma-, körte- és szilvafajták betakarítása. A hónap végén egyes korai diófajták termését is learatják.

Elvégzik a szükséges szervezési munkát a középkorai és késői alma-, körte- és szilvafajták betakarítására való felkészüléshez.

A gyümölcstároló létesítményeket fertőtlenítik és felkészítik az új termék fogadására. A gyümölcs válogatógépeket javítják és üzemkész állapotba hozzák. Megkezdődik az új ültetvények létesítésére szánt területek ültetés előtti előkészítése – mélyszántás, alaptrágyázás és egyengetés.

Eper ültetvényekben



Nagyon fontos, hogy minden eperültetvényt időben öntözzenek. Nem szabad megengedni a levelek aszalódását. Augusztusban a növények alakítják ki a következő évi termést, és optimális vízháztartást kell fenntartani. Az ültetvény korától és a talajtípustól függően 2-3 öntözést végeznek.

A futóhajtásokat levágják azokról a növényekről, amelyeket nem szaporítóanyagnak szánnak.

Gondoskodnak az anyaültetvényekről – gyomirtás, öntözés és talajművelés.

Folytatódik az új területek előkészítése az eper őszi ültetésére. Egyes magasabb fekvésű régiókban megkezdődhet az ültetés.

Málna ültetvényekben

Folytatódik az újonnan létesített ültetvények gondozása – szükség esetén öntöznék, és ha gyomok vannak, művelést végeznek. A termő ültetvényeket öntözik, hogy a termések megnőhessenek és kialakulhassanak a következő év terméséhez szükséges virágrügyek. A hónap végé felé az öntözést beszüntetik, hogy az új pótló vesszők megérjenek.



Folytatódik a málna betakarítása

Folytatódik az anyaültetvények gondozása – öntözés, nitrogéntartalmú műtrágyákkal való utántrágyázás és művelés. Augusztus végéig beszüntetik az öntözést, hogy a vesszők megérjenek. És a hónap végéig minden termést hozott vesszőt kivágnak, eltávolítanak és elégetnek.

Előkészítik az őszi létesítésre szánt új ültetvények helyszíneit. A talajt 3-5 t istállótrágyával, 80-100 kg szuperfoszfáttal (vagy ugyanannyi más foszforalapú műtrágyával), 25-30 kg kálium-szulfáttal (vagy ugyanannyi más káliumalapú műtrágyával) trágyázzák meg holdanként.

Fekete ribizli ültetvényekben

Folytatódik a gyökeresedő ágyások és fiatal ültetvények gondozása. Nem megengedett a talaj kiszáradása és a gyomtömeg. Gyenge növényi növekedés esetén a gyökeresedő ágyásokban és fiatal ültetvényekben 10-15 kg ammónium-nitráttal (vagy ugyanannyi más nitrogén-alapú műtrágyával) trágyáznak holdanként.

Befejeződik a gyümölcsök betakarítása a magasabb fekvésű területeken. Az ültetvényeket rendszeresen öntözik és művelik.

Egyéb kultúrákat tartalmazó ültetvényekben

Végrehajtják a datolyaszilva, aktinídia (kiwi), jujuba és pisztácia alanyainak nyári rügyezését. 5-6 nappal az oltás előtt a csemetekertet bőségesen öntözik a jobb kéreghántolás érdekében. 3-5 nappal a rügyezés előtt gyűjtik az oltóanyagot, és árnyékban, hűvös helyiségben tartják. Ellenőrzik a rügyezett datolyaszilva és egyéb növények fogását.

A citromot nyugvó rüggyel oltják. A citromcsemetéket egy héttel az oltás előtt és közvetlenül utána bőségesen öntözik.

Folytatódik a kívánt füge, homoktövis és aronia fajták és formák kijelölése, valamint az aktinídia, aronia, homoktövis és gránátalma zölddugványainak gyökeresedése.

Folytatódik a déli kultúrákat tartalmazó ültetvények öntözésének és kapa művelésének gondozása, különös figyelmet fordítva az újonnan létesített ültetvényekre.



A homoktövis (Hippophae rhamnoides), más néven rakita, szibériai ananász vagy tengeri szeder, a ezüsfafélék (Elaeagnaceae) családjába tartozó virágos növényfaj. A növénynek nagyon jól fejlett gyökérrendszere van, amely a talajt a meredek lejtőkön is megtartja. A gyökerek szimbiotikus kapcsolatot tartanak fenn az aktinobaktériumokkal. Ez a kapcsolat lehetővé teszi a nitrogén megkötését a levegőből. A talajban lévő oldhatatlan szerves és ásványi erőforrásokat is oldható formákká alakítják át.

Folytatódik a füge, homoktövis és aronia gyümölcsseinek betakarítása.

