

Szeptember – a körülmények lehetővé teszik a késői zöldségfélék további termésének kialakulását

Автор(и): Растителна защита

Дата: 07.09.2024 Брой: 9/2024



Szeptember első tíz napjának legtöbb napján a klimatikus normák feletti hőmérsékletek határozzák majd meg az agrometeorológiai viszonyokat, ami felgyorsítja a késői szántóföldi növények fejlődésének utolsó szakaszainak befejeződését. A késői hibrid kukoricánál a viaszérés és a teljes érés szakaszai figyelhetők meg. Az időszak első felében a keleti régiókban nagyobb valószínűséggel jósolnak csapadékot, valamint a felső talajrétegek nedvességtartalmának és a vetés előtti talajművelés végrehajtásának feltételeinek javulását. Az ország szántóföldi területeinek többi részén a feltételek lehetővé teszik a területek felszabadítását az érett napraforgó és kukorica betakarítását követően.

A hónap második tíz napos időszakában változás várható az agrometeorológiai viszonyokban. Az időszak legtöbb napjára viszonylagos hőmérséklet-csökkenést jósolnak, valamint a mezőgazdasági régiók több helyén csapadékos feltételeket. A várt csapadék, a nyár végén fokozódott aszályt követően, javítani fogja a felső talajrétegek állapotát és a minőségibb vetés előtti talajművelés, valamint az őszi repce vetés feltételeit. A repce vetés optimális agrotechnikai időkerete szeptember második tíz napjának végéig tart.

A második és a harmadik tíz napos időszak első felében várt csapadék növeli a gombás kórokozók kifejlődésének kockázatát az érésben lévő gyümölcs- és zöldségtermelésben: szürkepenész a szőlőben, késői barna rothadás a késői gyümölcstermő fajták termésén, lisztharmat a zöldségnövényeken.



Gyapottok-bagolylepke

Szeptemberben a késői szántóföldi termelésű zöldségnövények esetében nem szabad alábecsülni a gyapottok-bagolylepke harmadik generációjának hernyói elleni növényvédő permetezést, mivel ezek károsítják és rombolják a zöldségtermés minőségét.

A harmadik tíz napos időszak második felében száraz időjárás és kedvező feltételek várhatók az érett szőlőtermés betakarításához.

Szeptemberben nem jósolnak kritikus minimumhőmérsékleteket, és a feltételek lehetővé teszik a késői zöldségnövények további termésének képződését.

Forrás: OMSZ