

Elhalasztott vetés a téli repcénél és a fertőzések feltételei, valamint a késői mezőgazdasági növények kórokozóinak fejlődése

Автор(и): Растителна защита

Дата: 18.09.2024 Брой: 9/2024



A hosszú aszály után szeptember elején az ország számos részén (Szilisztra, Várna, Dobrics, Sztara Zagora, Burgasz, Haszkovo, Szandanszki) gazdaságilag jelentős, 30–40 l/m²-t meghaladó csapadék hullott.

Ezek a csapadékok még a késői tarlónövények számára is későn érkeztek, amelyek a talaj nedvességhiánya és a átlag feletti nyári hőmérsékletek következtében jóval a szokásos időkeretek előtt fejezték be fejlődésüket.

A jelenlegi héten is az instabil időjárás határozza meg az agrometeorológiai feltételeket. Az időszakban csapadék várható, ami javítja a felső talajrétegek nedvességtartalmát és a szezonális talajművelés

végrehajtásának feltételeit.

Az aszály miatt elhalasztották a téli repce vetésére szánt területek vetés előtti művelését, amely növény pontos talajelőkészítést igényel. Emiatt az ország számos részén a repce vetése az optimális agrotechnikai határidők után kerül sor. Ezek szeptember második tíz napos periódusának végén járnak le.

Az időszak legtöbb napján az előrejelzett hűvös idő, gyakori csapadékkal együtt, kedvező feltételeket teremt a fertőzéseknek és a kórokozók fejlődésének a késői mezőgazdasági növényekben: késői barna rothadás a gyümölcsfákon, szürke penész a szőlőben, lisztharmat a zöldségnövényekben.



Szeptember második tíz napos periódusában az őszi termelésre termesztett káposztánál figyelemmel kell kísérni a kártevőket: a káposztalepke, a káposztamoly és a gyöngyházlepke hernyóit, és ha sűrűségük meghaladja a gazdasági károsítási küszöböt (3–5 hernyó növényenként), rövid elővételi idővel rendelkező rovarirtószerekkel való kezelés szükséges.

Az elkövetkező időszak alkalmas a spenót és más leveles zöldségek őszi termelésre történő vetésére.

Forrás: OMSZ