

Október – agronómiai szempontból jelentős csapadék és kedvező feltételek a téli repce fejlődéséhez.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.10.2024 Брой: 10/2024



Októberben az agrometeorológiai viszonyokat a klímanorma körüli és feletti hőmérsékletek, valamint a havi átlaghoz közeli csapadékmennyiség fogja meghatározni. A nyári aszályt követően a szeptemberi, gazdaságilag jelentős csapadék Kelet-Bulgária egyes területein, valamint Nyugat-Bulgária helyenként javította a felső talajrétegek nedvességtartalmát és a szezonális talajművelés végrehajtásának feltételeit.

A szeptember végi csapadék egyenetlenül oszlott meg. Közép- és Északkelet-Bulgária számos helyén 30-35 l/m² körüli és feletti csapadékot jegyeztek fel (Veliko Tarnovo - 40 l/m², Ruse - 43 l/m², Razgrad - 36 l/m², Silistra

- 45 l/m², Varna - 45 l/m², Dobrich - 53 l/m²), ami lényegesen javította a felső talajrétegek nedvességtartalékát és a szezonális talajművelés végrehajtásának feltételeit. A középső és keleti régiókkal ellentétben Nyugat- és Dél-Bulgária egyes részein az őszi eleji csapadéknak nem volt gazdasági jelentősége. Az ország ezen részein a száraz és tömörödött talaj komolyan akadályozza a mélyszántást és a vetés előtti talajművelést a téli gabonafélék vetésére szánt területeken.

Október első dekádjának napjainak nagy részén nem várható jelentős csapadék, és a feltételek lehetővé teszik a földek előkészítését és a téli gabonafélék vetését. A nyári aszály akadályozta a téli repce időben történő vetését, és Közép-Bulgária szántóterületeinek egyes részein a vetés az agrotechnikai határidőn kívül fog megtörténni. Nagyon valószínű, hogy a későn bevetett állományok nem lépnek a rozettás stádiumba őszi vegetációjuk során, ami garantálná a növény sikeres, károk nélküli áttelelését.

Októberben zajlanak a téli gabonafélék vetésének optimális agrotechnikai időszakai. Észak-Bulgáriában az időkeret a hónap első felében, Dél-Bulgáriában a hónap második felében, a Fekete-tengeri régiókban pedig a harmadik dekádban van. A hónap első dekádjának végén és a második dekád elején, valamint a harmadik dekád második felében várható csapadék kiemelt jelentőségű lesz a búza és az árpa vegetációjának kezdeti szakaszainak normális lefolyása szempontjából. Októberben a vetési időpontoktól függően a búzában a következő fejlődési fázisok figyelhetők meg: kelés, első és harmadik levél.



A hónap második felében várható meleg idő előfeltétele lehet a mezei pocok populációjának növekedésének. Az őszi vetésű növényekkel bevetett területeket felügyelni kell, és amikor eléri a gazdasági kárküszöböt – GKK: 2 aktív kolónia/katonális hold – kezelni kell azokat.

A mezei munkákra kedvező feltételek a második dekád közepén és a harmadik dekád első felében lesznek, amikor viszonylag száraz időjárás várható.



Októberben a varasodással érintett alma- és körteültetvényekben a fertőzés csökkentése érdekében a lombhullás kezdetén, a gyümölcszedést követően célszerű 5%-os karbamid-oldattal végezni a kezelést.

A csonthéjas gyümölcsfajok esetében a tömeges lombhullást követően 2%-os bordói-lével permetezés javasolt a lyukasfoltosság, a korai barna rothadás és az őszibarack levélhajlító gombák ellen.

Október elején fagyokat jeleznek, ami korlátozni fogja a fagykárosodásra érzékeny késői zöldségfélék további termelésének lehetőségeit.