

Októberi agrotechnikai tevékenységek a gyümölcsösben

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 *Брой:* 10/2024



Októberben minden gyümölcsfafaj esetében aktívan zajlik a tartalék tápanyagok felhalmozódásának folyamata.

A hónap során az agrometeorológiai feltételeket a klímai normák körüli és feletti hőmérsékletek, valamint a havi normákhoz közeli csapadék fogja meghatározni.

Október első dekádjának napjain többségén nem várható jelentős csapadék. Esőzésre az első dekád végén és a második dekád elején, valamint a hónap harmadik dekádjának második felében számíthatunk.

A mezei munkákra kedvező feltételek a második dekád közepén és a harmadik dekád első felében állnak majd elő, amikor viszonylag száraz időjárás várható.

Gyümölcskertészeti csemetekben



Ügyelni kell a rétegezésre gyűjtött csonthéjas gyümölcsfajok magvainak csírázóképességének megőrzésére.

Megkezdődik a magágyakból való alanyok és a kétéves csemetefák kiemelésére való felkészülés.

A magágyakból származó alanyokat és az oltott fákat a vegetációs időszakuk befejezése után – október második felében és novemberben – emelik ki.

A növényeknek nem szabad leveleket hagyniuk. Ha a levelek még nem hullottak le, erre a célra 0,1-0,2%-os kalcium-kloridot használnak. A kiemelést az öntözés megkönnyíti.

Gyümölcsösökben



Folytatódik a mandula és néhány szilvafajta gyümölcsének betakarítása.

Az őszi-téli alma- és körtefajták betakarítását legkésőbb a hónap közepéig be kell fejezni.

Az egyéves és fiatal gyümölcsösök sorai közötti talajt mélyen megművelik.

Ha nem történt előzetes foszfor- és káliumtrágyázás ültetés előtt, akkor 50-60 kg szuperfoszfátot és 20-22 kg kálium-szulfátot – vagy más foszfor- és káliumtrágyázat ugyanilyen mennyiségben holdanként – alkalmaznak.

A foszfor- és káliumtrágyákat a termő gyümölcsösökben is mélyen be kell építeni.



Eper ültetvényekben

Folytatódik az új eper ültetvények létesítése.

A sarjűszemzetek ültetését legkésőbb a hónap közepéig be kell fejezni. A sarjűszemzeteket csomókban kell ültetni, kevés talajjal a gyökerek körül. Ültetés után $0,5-1 \text{ dm}^3$ vízzel öntöznék növényenként.

Elvégzik a termő ültetvények végső művelését – 10-15 cm mélységben, a növényeket enyhén feltöltve.

Folytatódik a tavaszi-nyári ültetésre szánt sarjűszemzetek kiemelése és előkészítése hidegtárolásra.

Málna ültetvényekben

Új málnaültetvények létesítésére szánt területeket készítenek elő.

A termő ültetvényeket 2-3 t istállótrágyával, 20-30 kg szuperfoszfáttal és 10-15 kg kálium-szulfáttal – vagy más foszfor- és káliumtrágyával ugyanilyen mennyiségben holdanként – trágyázzák, majd a trágyákat mélyen – 20-25 cm mélységben – beássák.

Feketeribizli ültetvényekben

Száraz körülmények között a termő és fiatal ültetvényeket öntözik.

Őszi trágyázást végeznek 1-2 t istállótrágyával, 20-40 kg szuperfoszfáttal és 10-15 kg kálium-szulfáttal – vagy más foszfor- és káliumtrágyával ugyanilyen mennyiségben holdanként. A sorok közötti talajt 15-18 cm mélységben, a növények közelében pedig 5-6 cm mélységben művelik.

Egyéb növények ültetvényeiben

Őszi szántást végeznek 18-20 cm mélységben, ami hozzájárul a téli csapadékból származó jó talajnedvesség-tároláshoz.

A harmadik év után a babérültetvények föld feletti részét 20-25 cm-re vágják vissza a gyökérnyaktól. A levágott szárazakat száraz, jól szellőző helyiségbe viszik a levelek szárítására.



Megkezdődik a datolya szilva, a gránátalma és a kivi (aktinídia) betakarítása.

A hónap végén, fagyveszély és viszonylag száraz időjárás esetén, az összes babérnövényt (babérlevél, babér) ekével feltöltik.

Folytatódik a füge gyümölcsének betakarítása.

Folytatódik a gyökeresedésre telepített aktinídia, arónia, homoktövis és egyéb növények zölddugványainak ápolása.

Megkezdődik a csombor magok gyűjtése a pisztácia alanyok előállításához.