

Növényvédelmi tevékenységek az ültetvényben októberben

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.10.2024 *Брой:* 10/2024



Október elején fagyokat jósolnak.

Októberben a varasodással érintett alma- és körteültetvényekben a fertőzés csökkentése érdekében célszerű a lombhullás kezdetén és a gyümölcsök betakarítása után 5%-os karbamid oldattal végezni a kezelést.

A csonthéjas gyümölcsfajoknál a tömeges lombhullás után a lyukasfoltosság, a korai barna rothadás és az őszibarack levélfodrosodás kórokozóival szemben 2%-os bordói lévvél való permetezés javasolt.

Gyümölcsösökben

A gyümölcsfákra fészek- és etetőládákat helyeznek el a hasznos madarak vonzása érdekében.

A hullámos kartondiszperz csapdákat a jelen lévő almamoly, szilvamoly és diómoly hernyókkal együtt gyűjtik össze és lógó ketrecekbe helyezik az ültetvényekben – a harkályok és más madarak elpusztítják a diszperzben lévő hernyókat.



A téli araszóval fertőzött ültetvényekben minden egyes fa törzsén egy ragadós diszperzt helyeznek el 20–100 cm magasságban. A diszperzek 20 cm széles papírból készülnek, a felső és alsó szélüket megkötik. A bevonathoz lassan száradó ragasztót használnak. Annak érdekében, hogy a rovarok ne rejtőzhessenek el, mielőtt elérnék a diszperzt, a repedezett kérget a diszperztől lefelé a talajfelszínig előzetesen lekaparják.

Az alma és körte gyümölcsöket a válogatási és kezelési pontokon ellenőrzik a kaliforniai pajzstetű és a selyemfapajzstetű jelenlétére a nem fertőzött területeken.



Az amerikai fehér medvelepke hernyófészkeket megszámlálják a kártevő egyedsűrűségének meghatározása érdekében.



A szeptember végén megkezdett fakövetés folytatódik a körte rügypúró egyedsűrűségének meghatározása érdekében. Ha a sűrűség meghaladja a gazdasági küszöböt, a pete rakás előtt a fákat kontakt rovarirtóval permetezik bármely csoportból – Decis 100 EC (12,25 ml/da) vagy más deltametrin alapú készítmény, Sumi Alpha 5 EC (0,03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/da), Lamdex extra (100–120 g/da) és mások.

A körteültetvényeket a körte levéltetű ellen permetezik az egyik rovarirtóval – Bermectin (40–120 ml/da) vagy más abamektin alapú készítmény, Voliam Targo 063 SC (75 ml/da), Imidan 50 WG (150 g/da), Delegate 250 WG (30 g/da), Deka EC (50 ml/da) vagy más deltametrin alapú készítmény, Movento 100 SC (0,12–0,15%), Naturalis (100–200 ml/da), Sineis 480 SC (30–44 ml/da), Flipper (1–2 l/da).



A gyapjas almastetűvel fertőzött, az *Aphelinus mali* parazitoid darázs által parazitált hajtásokat levágják és hűvös helyen, árnyékban, fedett helyen tárolják. Az ezt a darazsat tartalmazó gyapjas almastetűk fekete színűek és nincs kilépő nyílásuk. A következő év tavaszán biológiai védekezésre használják fel őket.