

November – az agrometeorológiai feltételeket a klímanormákhoz közeli hőmérsékletek és csapadék határozzák majd meg.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.11.2024 Брой: 11/2024



Novemberben az agrometeorológiai feltételeket a klímanormákhoz közeli hőmérsékletek és csapadék határozzák meg.

Az októberi kiterjedt aszály megnehezítette a téli gabonafélék vetését, és a tervezett területek egy része novemberben, az agrotechnikai határidők után kerül bevetésre. Az októberi normál alatti csapadék következtében a talaj nedvességtartaléka az ország legtöbb részén az 50 és 100 cm-es rétegekben, kivéve néhány helyet az északkeleti régiókban (Dobrich), szokatlanul alacsony a kőszak közepére – egyes helyeken a

teljes vízkapacitás 50%-a alatt (agrometeorológiai állomások: Knezha, Bazovets, Kyustendil, Sandanski, Plovdiv, Pazardzhik, Chirpan).

November első tíz napjának első felében nem várható csapadék, és a búza, az árpa és a téli repce fejlődését a legtöbb szántóterületen továbbra is a talajnedvesség hiánya korlátozza.

Az október végén és november elején megfigyelt évszak feletti hőmérsékletek után hűvösödés és az agrometeorológiai feltételek változása várható. November elején a napok nagy részében a hőmérséklet a klímanormák alatt, de a téli gabonafélék vegetációjához szükséges biológiai minimum felett lesz. Az időszak alatt nem várható gazdasági jelentőségű csapadék, és az őszi vetésű növények fejlődését továbbra is a talajnedvesség hiánya korlátozza. November elején a október közepéig bevetett téli gabonaféléknél a csírázás és 1-2 levél képződésének fázisai figyelhetők meg.

A gabonamolyok veszélye soha nem csökken

A búza és az árpa vegetációjának kezdeti szakaszában a károkozók után kell nyomon követni a növényeket. Kártételt okoznak a mezei pocok, a búzalevélbogár lárvái és a gabonamolyok, és ha sűrűségük meghaladja a gazdasági kárküszöböt, időben kell védekezni a növényvédő intézkedésekkel.



A svédleány lárvái

Csapadék és a felső talajrétegek nedvességtartalékának fokozatos javulása várható november első tíz napjának második felében és a második tíz napos időszak alatt.



A gabonafélék legveszélyesebb kártevője a mezei futóbogár (Zabrus tenebrioides), amely a búzát, az árpát, a kukoricát, az zabot és számos fűfélét támadja meg.

A harmadik tíz napos időszak alatt a napi átlaghőmérséklet előrejelzett értékei, az időszakra jellemző normál körül és felett, meghaladják az őszi növények vegetációjához szükséges biológiai minimumot.

November végére a búza és az árpa különböző növekedési stádiumokban lesz – a csírázástól az 1., 2. és 3. levélig. A téli gabonafélékben az októberben vetetteknel a harmadik levél stádium lesz túlnyomó. A repcénél csak a növények egy része fogja tudni elérni a rozettaképződés stádiumát (5-7 levél) november folyamán.

A hónap folyamán a -7°C-ig várható minimális hőmérsékletek a csírázási stádiumban lévő téli gabonafélék kritikus szintje felett vannak.

Novemberben a gyümölcsösökben az őszi növényvédő permetezések végrehajtásához kedvező feltételek a hónap elején, a második tíz napos időszak közepén és a harmadik tíz napos időszak napjainak nagy részén várhatók. A csonthéjas gyümölcsfajok (alma, körte) esetében a varasodás fertőzések korlátozására 5%-os

karbamid oldattal való kezelés javasolt. A maghéjas gyümölcsfajoknál a tömeges levélhullás után 2%-os bordói lével permetezés szükséges a lyukasfoltosság, a korai barna rothadás, az őszibarack levélhajlító betegség és egyéb kórokozók ellen.

November második fele alkalmas időszak a gyümölcsfák ültetésére.