

Az országban egyenetlenül eloszló csapadék a téli gabonafélék fenológiai állapotában különbségekhez vezet.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 20.11.2024 Брой: 11/2024



A november második dekádjának végéig és a harmadik dekádjának elejéig az átlagos napi hőmérsékletek a klimatikus normák felett, valamint a téli gabonanövények vegetációjához szükséges biológiai minimum felett fognak alakulni.

Az időszak alatt nem várható jelentős csapadék és az őszi talajnedvesség-tartalékok szintjének változása. Az elmúlt időszakban lehullott csapadék egyenetlenül oszlott meg. Az ország északnyugati régióiban, a Felső-

Tráciai-alföldön és az ország legdélebbi részein sok helyen 10-12 l/m² alatti csapadékot regisztráltak – ami teljesen elégtelen a téli gabonanövények nedvességhiányának leküzdéséhez.

Néhány keleti régióban (Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Karnobat) jelentős, 25-30 l/m² feletti csapadék hullott. E régiókban javulás következett be a felső talajrétegek nedvességtartalékában és az őszi vetésű növények vegetációjának feltételeiben.

Míg az országban október és november eleje aszályos időszak volt, mezőgazdaságilag hatékony csapadék nélkül, addig a Dobrich régióban elegendő talajnedvesség-tartalékok figyelhetők meg, amelyek hozzájárulnak a búzaállományok jó fejlődéséhez. A hőmérsékletek lehetővé teszik a normális csírázást, ahol elegendő a nedvesség. A Dobrudzsában uralkodó alacsonyabb hőmérsékletek megvédik az őszi vetésű állományokat a kártevők, például a gabonalegyek és a levéltetvek támadásától.

Az időszak alatt különböző fejlődési fázisok figyelhetők meg a búzában – csírázás, kelés (agrometeorológiai állomások: Knezha, Nikolaevo, Kazanlak, Plovdiv, Haskovo, Yambol) és az 1–2. és 3. levél kifejlődése (Novachene). A téli gabonanövények fenológiai állapotában mutatkozó különbségek a hosszú őszi aszály és a késői vetés következményei.

Az időszak alatt a feltételek kedvezőek lesznek gyümölcsfák ültetésére és fitoszerviz tevékenységek végrehajtására gyümölcstermő növényekben.

Forrás: OMSZ