

December elején a várt csapadék növelni fogja a talaj felső rétegeinek nedvességtartalmát.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.12.2024 Брой: 12/2024



A következő hétnapos időszakban jelentős változáson mennek keresztül az agrometeorológiai viszonyok. Nyugat-Bulgáriában jelentős hőmérséklet-csökkenés várható, de anélkül, hogy az elmaradott fejlődésű őszi növények számára kritikus minimumértékeket érne el. A december eleji hidegidő lassuláshoz, a magasabban fekvő területeken pedig, ahol hótakaró képződése várható, a téli gabonanövények vegetációs folyamatainak teljes leállításához vezet.

Az ország keleti és déli régióinak nagy részén az előrejelzett napi átlaghőmérsékletek közel lesznek a téli gabonanövények fejlődéséhez szükséges biológiai minimumhoz. A Fekete-tenger menti régiókban, ahol magasabb hőmérsékleteket jeleznek, vegetációs feltételek alakulnak ki az őszi növények számára.

Az időszak alatt várható csapadék növelni fogja a talaj felső rétegeinek nedvességtartalékát. Ez a csapadék egyes helyeken a középső és déli régiókban későn érkezik a növények számára, ahol a talajnedvesség hiánya miatt a kicsírázott téli gabonanövények nem keltek ki. A hosszú őszi szárazság következtében a téli gabonanövények nagy része gyengén gyökerezik, fejlődésük kezdeti szakaszában van, és az állományok egyenetlen sűrűségűek. December elején a következő fejlődési fázisok figyelhetők meg a búzában: kikelés, 1–2 és 3 levél. Az északkeleti régiókban, ahol az őszi első felében a nedvesség nem volt korlátozó tényező, az állományok egy kis része a szárhasadás szakaszában van (Provadia régió) – ez a megfelelő fázis az átteleléshez.

Az időszak alatt kedvezőbb feltételek alakulnak ki gyümölcsfák ültetésére az ország keleti régióiban.

Forrás: NIMH