

Teendők a gyümölcsösben januárban

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 10.01.2025 *Брой:* 1/2025



Januárban az agrometeorológiai feltételeket dinamikus időjárás fogja meghatározni, a normál feletti, normálhoz közeli és normál alatti hőmérsékleti időszakok váltakozásával. A hónap során a várakozások szerint a csapadék, amely a klímai normák körül és felett lesz, növelni fogja a nedvességtartalékokat a két méteres talajrétegben is. A decemberi csapadék, amely az ország számos részén meghaladta a havi normát, jelentősen megnövelte a talaj nedvességtartalékát.

Januárban a gyümölcsösökben a metszés végrehajtására kedvezőbb feltételek a hónap elején, a második évtized végén és a harmadik évtized első felében állnak majd elő.

Agrotechnikai tevékenységek

Gyümölcsösökben



Folytatódik a gépi kontúr- és kézi metszés az alma- és körteültetvényekben.

A gyümölcstároló létesítményekben figyelik a tárolási rendszer betartását. Folytatódik a régi támasztó szerkezetek javítása és az újak építése, valamint megkezdődik a trágya szállítása és szétszórása a gyümölcsösökben, ha az időjárási feltételek lehetővé teszik.

Gyűjtik a tavaszi oltáshoz szükséges szemző vesszőket.

Ügyelnek a rétegezésre készített magvak védelmére, és meghatározzák az új gyümölcsösök telepítésére szánt területet.

Eper ültetvényekben

Megtömörítik a talajt az őszi telepítésű, a hőmérséklet-ingadozások és a hó hiánya miatt megnövekedett eperpalánták körül.

Megkezdik a kényszertermesztésű epergyümölcsök számára szánt üvegházak fűtését.

Korai epertermesztéshez műanyag alagutakat építenek.

Málna ültetvényekben



Új támasztó szerkezeteket építenek és a régieket javítják.

A fiatal növények talajból való kiemelkedésének megakadályozására megtömörítik a körülöttük lévő talajt, és ahol lehetséges, kb. 10 cm-re a gyökértő fölé hánynak fel.

Fekete ribiszke ültetvényekben



Folytatódik a termésre való metszés és a dugványok gyűjtése. Ügyelnek a tavaszi ültetésre szánt gyökeresedett növények megőrzésére. Megvizsgálják a gyökeresítő ágyásokat, és a kiemelkedés és a téli fagyás veszélye esetén megtömörítik a növények körüli talajt. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy a tároló létesítményekben lévő gyümölcsök ne melegedjenek túl. Meghatározzák a ásványi műtrágyák igényeit, és ahol lehetséges, biztosítják a tavaszi trágyázáshoz szükséges mennyiségeket.

Egyéb növényekkel telepített ültetvényekben

Folytatódik a dugványok gyűjtése aktinídiából, aróniából, gránátalmafaból, homoktövisből és fűgéből.

Folytatódik az aktinídia magjainak gyűjtése, és rétegezésre helyezik őket. A rétegezésnek alávetett kaukázusi datolya szilva magjait rendszeresen megnedvesítik; ezeket japán datolya szilva alanyaként fogják használni. Az arónia magjait megtisztítják a húsos résztől, alaposan megmossák és rétegezésre helyezik tiszta folyami homokkal a pincelokálokban. Folytatódik a dróttartó szerkezet építése az aktinídia ültetvényekben.

Növényvédelmi intézkedések

Elvégezhető a fásszárú és a kisgyümölcsű fajok téli permetezése. A téli permetezés eredményei akkor jók, ha a permetoldatokat nagy cseppek formájában juttatják fel, és a fásszárú és kisgyümölcsű fajok minden részét bevonják a permetoldattal. Fásszárú fajoknál ezt úgy érik el, hogy $100\text{--}150\text{ dm}^3$ permetoldatot juttatnak fel holdanként erős permetezőkkal szélcsendes időben.

Fásszárú fajokra:



A kis téli araszoló petéi. A kis téli araszoló (*Operophtera brumata*) elterjedt hazánkban, és az egyik gyakran tömegesen szaporodó levélrágó kártevő. Ha nem végeznek ellene védekezést, komoly károkat okoz a gyümölcsfáknak. Az összes gyümölcsfaj mellett számos erdei és egyéves növényt is megtámad.

A permetezést 3%-os Para Zomer vagy Acarzin oldattal végzik pajzstetvek és levéltetvek, levélbolhák, gyapjas alma levéltetű, téli araszolók petéi, atkák, a levélaknázó moly bábjai stb. ellen, amelyek a fatörzseken és a koronákban telelnek át. A permetezést csak akkor végzik, ha egyes kártevők egyedsűrűsége meghaladja a gazdasági károsítási küszöböt.



Barna rothadás

A permetezést 2%-os bordói lével vagy egyéb rézalapú készítményekkel végzik a szilvafák zsebes szilva betegsége, a tűzelhalál almaféléknél, a barack levélhajlító betegsége, a cseppfoltosság csonthéjasokon, barna rothadás, baktériumos rák, valamint a lehullott levelek ellen, hogy elpusztítsák az alma- és körtevarasodás, a szilva vörös levélfoltosság, a dió antraknózisa, a mandula Cercospora levélfoltossága és varasodása telelő kórokozóit.

Kisgyümölcsű fajokra:



Didymella a málna szárain

Didymella, Coniothyrium, antraknózis, szürkepenész, fehér levélfoltosság és vörös levélfoltosság ellen az eperen (ha nem végezték el a betakarítás után), valamint a málna levélfoltossága ellen 1%-os bordói lével vagy egyéb rézalapú készítményekkel végeznek kezelést, és a lehullott leveleket is permetezik.



A kaliforniai pajzstetű (Quadraspidotus perniciosus) karantén kártevő, és csak Bulgária egyes régióiban fordul elő.

A kaliforniai pajzstetű ellen kisgyümölcsű fajokon 3%-os Para Zomer vagy Acarzin oldattal végeznek kezelést.

Folytatódik a gyümölcsös gépek, öntözőberendezések, permetezők és porlasztók stb. javítása. Ügyelnek a növényvédő szerek nedvességtől való védelmére; beszerzik a szükséges mennyiségeket és elrendezik őket a raktárakban. Készítenek entomológiai ketrecek, kereteket, izolátorokat és fénycsapdákat. Beszerzik a sárga ragadókártyákat és egyéb, a gyümölcsfélék gazdaságilag jelentős kártevői elleni növényvédelmi intézkedések előrejelzéséhez szükséges anyagokat.

Új mérgezett csalétek kerülnek elhelyezésre az egerek ellen a gyümölcsültetvény anyag számára készített árkokban.

Kiválasztják az új gyümölcsösök telepítéséhez szánt fajtákat.

További információ a témában:

Kaliforniai pajzstetű - Quadraspidotus perniciosus Comst