

Február elején az őszi növények jó állapotban vannak.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.02.2025 Брой: 2/2025



A január utolsó hetében tapasztalt szokatlanul magas, az ország számos részén 17-18°C-ot, Észak-Bulgária egyes régióiban pedig akár 20°C felett is elérő hőmérséklet (Vraca - 22°C, Pleven - 22°C, Lovecs - 22°C, Veliko Tarnovo - 23°C, Szilisztra - 20°C) a növényzeti folyamatok újraindulásához vezetett az őszi vetésű növények egy részénél az ország mezőgazdasági területein. A január átlagon felüli hőmérséklete megzavarta néhány fajtá nyugalmi állapotát is.

A Dobrudzsai őszi vetésű növények összességében jó állapotban vannak – jelentette Prof. Dr. Ivan Kirjakov, a Dobrudzsai Agrárkutató Intézet – General Toshevo „Gabona- és hüvelyes takarmánynövények nemesítése” Tanszékének vezetője. A búza a vetés időpontjától függően különböző fejlődési szakaszokban van – egyes

állományok kilépnek a szárhasításból, mások a fázis elején tartózkodnak. Tanácsa szerint a trágyázást február második feléig érdemes halasztani.

Dél-Bulgária növényei is normálisan fejlődnek és a szárhasítási szakaszban vannak. Nem figyeltek meg betegségekből, kártevőkből vagy a búza téli pusztulásából eredő károkat – osztotta meg velünk Dr. Evgeny Dimitrov docens a „K. Malkov” Növényi Genetikai Erőforrások Intézetből, Szadovóból. Ott a búza nitrogén utántrágyázása általában február elején kezdődik.

Az ország egész területén a növények fejlődésének korlátozó tényezője a talajréteg nedvességtartalma, amely az ország déli régióinak viszonyaiban az elmúlt években nagyon alacsony, a normál értékek jóval alatti szintjét mutatta.

Az évszaknak nem megfelelő meleg időjárás után a hét végére változás következik be az agrometeorológiai viszonyokban, amely a periódus második felében jelentős lesz. A várható hideg időszak megállítja a téli gabonanövények idő előtti vegetációját és visszafogja a gyümölcsfák nemkívánatos korai fejlődését.

Az időszak alatt nem várhatóak kritikus minimum hőmérsékletek a telelő mezőgazdasági növények számára.

A talajművelés és a szőlőskertek, gyümölcsösök metszése számára kedvezőbb feltételek az időszak elején alakulnak ki.

fotó© bluedesign - Fotolia.com

Forrás: NIMH és Agri.bg