

A február második felében – a csapadék és hóesés növeli a nedvességtartalék szintjét, és javítja az őszi növények áttelelési feltételeit.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 16.02.2025 Брой: 2/2025



Az elmúlt hétnapos időszakban mért alacsony minimumhőmérsékletek, helyenként Északnyugat-Bulgáriában és a magasabb fekvésű völgyekben -13°C - -14°C -ig, illetve az alá (Vidin, Knezha, Dragoman, Kazanlak), próbára tették a hótakaró nélküli körülmények között fejlődő őszi növények fagytűrő képességét. Az ilyen nagyságrendű értékek, ha hosszabb ideig tartanak, kritikusak lehetnek a 2-3 levél stádiumban áttelelő őszi gabonák számára.

Az északnyugati régiókban a növények terepi ellenőrzése várható a lehetséges fagykárok felmérésére (agrometeorológiai állomások: Bazovets, Knezha, Kyustendil, Kazanlak).

A február közepi rövid időszak hőmérséklet-emelkedését követően a következő hétnapos időszakban változás következik be az agrometeorológiai viszonyokban. Az időszak legtöbb napján a klímánormál alatti hőmérsékletek határozzák meg őket, amelyek továbbra is a nyugalmi állapotban tartják az őszi növényeket. A előrejelzett minimumértékek az áttelelő mezőgazdasági növények kritikus küszöbértékei felett vannak.

A várt csapadék és hóesés növelni fogja a talaj nedvességtartalékának szintjét a 50 cm-es talajrétegben. A január és február első felében a normál alatti csapadékmennyiség következtében az ország nagy részén a 100 cm-es réteg talajnedvesség-tartalékai az évszakra nézve kielégítőtlenek. Az időszak második felére hótakaró képződésének megnövekedett valószínűsége és az őszi növények áttelelési feltételeinek javulása várható.

Forrás: NIMH