Растителна защита
електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Március elején a csapadék és a hóesés növeli a talaj nedvességtartalékainak szintjét.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2025 *Брой:* 3/2025

Az elmúlt hétnapos időszakban mért alacsony minimumhőmérsékletek, helyenként Északnyugat-Bulgáriában és a magasabb fekvésű völgyekben Vidin, Kneja, Dragoman és Kazanlak környékén mínusz 13-14°C-ig, illetve az alá, próbára tették a hó nélküli körülmények között fejlődő őszi növények fagytűrő képességét. Az ilyen nagyságrendű értékek, ha hosszabb ideig tartanak, kritikusak lehetnek a 2-3 levél stádiumban áttelelő őszi gabonanövények számára.

Az északnyugati régiókban a Băzovec, Kneja, Kyustendil és Kazanlak agrometeorológiai állomásokon várhatóan ellenőrzik a növényeket a lehetséges fagyárok miatt.

ISSN 2815-522X

A február utolsó hetének rendkívül alacsony hőmérsékletei katasztrofális hatással voltak a Ruse–Silistra régió gyümölcsöseire. Egyes helyeken a hőmérséklet mínusz 24 fokig csökkent, aminek következtében a kajszik gyümölcsrügyeinek nagy része megfagyott – osztotta meg Nikolay Kolev, a Rusebeli Duna-menti Gyümölcstermesztők Szövetségének elnöke. Fáradások figyelhetők meg cseresznye, őszibarack, szilva, alma és körte esetében is.

Február végén és március elején a hőmérséklet az éghajlati normál alatt marad, ami a őszi vetésű növények nyugalmi állapotát fogja fenntartani. A előrejelzett minimumértékek az áttelelő mezőgazdasági növények kritikus küszöbértékei felett vannak.

A várt eső és hó formájában érkező csapadék növelni fogja a talaj 50 cm-es rétegében lévő nedvességtartalékok szintjét. A januárban és február első felében a normál alatti csapadékmennyiség következtében az ország nagy részén a talaj 100 cm-es rétegében a nedvességtartalékok az év ezen időszakára nézve kielégítőtlenek. A jövő heti hétvégéig megnövekedett a hótakaró kialakulásának és az őszi vetésű növények áttelelési körülményeinek javulásának valószínűsége.

Forrás: NIMH