

Márciusban a hőmérséklet a klímanorma körül és felett lesz, a csapadékmennyiség pedig a norma körül és alatt.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 09.03.2025 Брой: 3/2025



Az első tíz nap első felében az előrejelzett hőmérsékletek olyan tartományokba esnek, amelyek korlátozzák a mezőgazdasági növények fejlődését.

A tíz nap második felében jelentős hőmérséklet-emelkedés várható, és átlagos napi értékeik eléri és meghaladják a téli gabonanövények vegetatív folyamatainak újraindításához szükséges biológiai minimumot.

A március második tíz napjára előrejelzett átlagon felüli hőmérsékletek ösztönözni fogják az őszi vetésű állományok vegetációját. Ebben az időszakban a jelenleg harmadik levéltáadiumban lévő búza- és

árpaállományok egy része a szárhajtás stádiumába lép.

A 20°C-ig és afölött várható maximum hőmérsékletek a vegetatív folyamatokat a évelő növények nagy részében is aktiválják. A gyümölcstermő növényeknél a korai virágzású csonthéjas fajoknál (mandula, kajszi, őszibarack) a rügyduzzadás és a rügyattanás stádiuma zajlik majd. A szőlőültetvényeken a mezőgazdasági területeken nedvzés figyelhető meg.

Az időszak feltételei alkalmasak lesznek a téli növények nitrogéntartalmú ásványi műtrágyákkal történő utántrágyázására, a vetés előtti talajművelésre és a korai tavaszi növények (borsó, borsó, tavaszi árpa) vetésére.

Március második tíz napjának elején nem várható csapadék, ami lehetőséget nyújt a virágzás előtti megelőző permetezés időben történő elvégzésére a gyümölcsösökben réztartalmú gombaölő szerek alkalmazásával a virágrohadás, az őszibarack levélhajtás-fodorodás, a varasodás és egyéb kórokozók ellen.

A harmadik tíz nap alatt az előrejelzett, a klimatikus normák körüli és azokat meghaladó hőmérsékletek aktív vegetatív folyamatokat tartanak fenn a mezőgazdasági növényekben. A hónap végén az ősszel szárhajtott téli gabonanövényeknél a szárhajtási tényező növekedése figyelhető meg.

Márciusban a gyümölcstermő növényeknél a rügyduzzadás és a rügyattanás stádiuma zajlik. A hónap végén a korai virágzású fajoknál – mandula, kajszi és őszibarack – a virágrügy-stádium figyelhető meg, és a déli régiók egyes helyein – a virágzás kezdete. A szőlőültetvényeken a mezőgazdasági területeken nedvzés figyelhető meg.

A hónap során az előrejelzett, mínusz 7°C-ig érő minimum hőmérsékletek kockázatot jelentenek a rügy- és virágstádiumban lévő gyümölcstermő növényekre.

A márciusban bekövetkező csapadék növeli a talaj nedvességtartalékát a 100 cm-es talajrétegben. Február végén az ország nagy részén, néhány keleti régióbeli hely kivételével, a téli gabonanövények egy méteres rétegben mért talajnedvesség-tartalékának szintje alacsony az évszakra képest – a Duna-menti síkság és a déli régiók egyes részein a teljes víztartó képesség (TVK) 70%-a alatt van. Általában a tél végén, éghajlati anomáliák nélküli években a talaj nedvességtartaléka az egy méteres rétegben a TVK szintjét éri el.

Márciusban a korai és középkorai tavaszi növények vetésére szánt területek vetés előtti talajművelésének végrehajtására alkalmasabb feltételek a hónap második felében állnak majd elő. Március közepén kezdődik a

napraforgó vetésének agrotechnikai időszaka (15-20.03) Dél-Bulgáriában, és a harmadik tíz nap közepén (25.03–5.04) – a Duna-menti síkságon.

Forrás: NIMH