

Április – ingatlan időjárás és mezőgazdaságilag jelentős csapadék

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.04.2025 Брой: 4/2025



Áprilisban az agrometeorológiai viszonyok fokozott dinamikával jellemezhetők. A hónap napjainak nagy részében instabil időjárás határozza meg őket. A várható, a klímanorma körüli és feletti csapadék jó talajnedvesség-tartalékokat biztosít az 50 cm-es rétegben, és kedvező feltételeket teremt a búza és a vetett tavaszi növények vegetációjához. Ezt közli az OMSZ agrometeorológusainak havi előrejelzése.

Április első felében a mezőgazdasági növények fejlődését a klímanorma körüli és alatti napi középhőmérsékletek jellemzik. Az első évtizedben a búza a szárhajtás (lódoboz) stádiumába lép.

A második évtizedben mínusz 2-3°C-ig terjedő negatív minimumhőmérsékletek várhatók, ami fokozott kockázatot jelent a gyümölcsfák virágzására és fiatal terméskötődésére. Az utolsó tavaszi fagyok az évtized végén várhatók, amit figyelembe kell venni a zöldségpalánták keményítése során.

Szeptóriás betegségek a búzában

A második évtized végén és a harmadik évtizedben a napi középhőmérsékletek emelkedése és a mezőgazdasági növények fejlődési ütemének felgyorsulása várható. Ebben az időszakban a búza a szárhajtásból a kalászszemzés, majd a kalászosodás stádiumába lép. A szárhajtás – kalászszemzés interfázis kritikus időszak a szeptóriás levélfoltosság fertőzésére nézve.



A búzaállományokat kártevők (búzalevéltetű, gabonapoloska) jelenlétére is figyelemmel kell kísérni, és amennyiben a sűrűségük meghaladja a gazdasági kárküszöböt, időbeni kezelésre van szükség.



Alma varasodás

A hónap során gyakori csapadék kedvező feltételeket teremt számos gyümölcstermő növény gombás betegségeinek (virág- és hajtásmolyhásodás, varasodás, levéllyukacsosodás, barack levélhajtás-fodorodás stb.) fertőzési hátterének növekedéséhez. A harmadik évtized első felében fokozott a jégesőveszély. A jégeső által károsított gyümölcsfákat a lehető leghamarabb réztartalmú fungicidekkel kell kezelni a kórokozók általános másodlagos fertőzések kockázatának csökkentése érdekében.

Áprilisban a növényvédő permetezések végrehajtására kedvezőbb feltételek a második évtized elején és végén, valamint a harmadik évtized második felében állnak elő.

A harmadik évtized elejére a talajhőmérséklet a 10 cm-es rétegben eléri a kukorica vetéséhez megfelelő értékeket, április végére pedig a hőkedvelő tavaszi növények (gyapot, bab, földimogyoró, görögdinnye, sárgadinnye stb.) vetéséhez szükséges hőmérsékletet.