

Express gyomirtás a magas napraforgóhoz

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 16.04.2025 Брой: 4/2025



Az FMC Agro Bulgária herbicidjei – az Express® 50 SG és az Evorelle® Express® – szelektív védelmet és tiszta veteményt biztosítanak a napraforgó korai növekedési szakaszában.

A Express® 50 SG és az Evorelle® Express® herbicid széles levelű gyomok szelektív irtására szolgálnak az Express® és Evorelle® Express® toleráns napraforgó hibridjeiben. Különösen fontos, hogy a herbicideket **kizárólag toleráns hibrideken alkalmazzák**, melyek listája az FMC weboldalán érhető el. További információért kérjük, forduljon az FMC értékesítési képviselőihez.

Az Express® 50 SG és az Evorelle® Express® az egyedüli, bejegyzett herbicidok, amelyek a nagy számú, Express® 50 SG / Evorelle® Express® toleráns napraforgó hibridben használhatóak.

Express® 50 SG – bevált hatékonyság a napraforgó kulcsfontosságú széles levelű gyomai ellen

Az Express® 50 SG egy szisztémás, felületkezelés utáni herbicid, amely megbízható irányítást biztosít a napraforgó legelterjedtebb és legnehezebben irtható széles levelű gyomai, mint például a **mezei aszat**, a **szulák**, a **disznóparéj**, a **bojtorján**, a **fehér libatop**, a **magyalapu disznóparéj** és mások ellen. A gyomnövekedés már néhány órával a kezelés után leáll, és a gyomok teljes elpusztulása 15-25 napon belül következik be.

A termék teljes hatékonyságának biztosításához a permetléhez hozzá kell adni a Trend® 90 adjuvantot. A stressznek kitett növények kezelése nem ajánlott.

Evorelle® Express® – új megoldás komoly kihívásokra

Az Evorelle® Express® kombinált hatású herbicid, amely a napraforgó rezisztens széles levelű gyomainak hatékony irtására szolgál. Az Evorelle® Express® különösen olyan körülmények között alkalmas, ahol nehezen irtható gyomok terjednek, mint például a **kenderköles**, a **mezei aszat**, a **bojtorján**, a **fehér libatop**, a **szudáni pázsit** és különböző **disznóparéj fajok**. A termék gyorsan behatol a gyomszövetekbe, és blokkolja a növekedéssel kapcsolatos enzimes folyamatokat. Látható tünetek tíz napon belül megjelennek a kezelés után, és az érzékeny fajok elpusztulása 15–25 napon belül következik be.

A gyomirtás kedvező környezetet teremt, de a növekedéshez kiegyensúlyozott tápanyagellátás is szükséges. Az FMC levéltrágyái és biostimulánsai – az **Rhizomagic**, a **Seamac™ OR**, a **Nuvola™ AMIN** és a **BO-LA™** – a szükséges tápanyagokkal, aminosavakkal és bioaktív vegyületekkel látják el a növényeket, amelyek támogatják a növekedést, növelik a toleranciát és kompenzálják a stresszes körülményeket. Némelyikük, köztük a Rhizomagic, a Seamac™ OR és a Nuvola™ AMIN szerepel a Bolgár Élelmiszer-biztonsági Hatóság (BFSA) bejegyzett szerves és szervás-ásványi trágyák listáján, és **alkalmasak ökosémák keretében történő használatra**.