

Április végén – változékony idő csapadékkal és fagy kialakulásának lehetőségével.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.04.2025 Брой: 4/2025



Április végén az agrometeorológiai viszonyokat instabil időjárás és az április harmadik dekádjára jellemző klímanormához közeli hőmérsékletek határozzák meg. Az elmúlt időszak végén bekövetkező csapadék a nyugati régiók számos területén növelte a felső talajrétegek nedvességtartalmát. Az időszak első napjaiban csapadék várható, ami javítja a termesztési feltételeket az ország keleti régióiban is.

A téli gabonafélék és a vetett tavaszi növények fejlődése az időszak második felében a normál alatti hőmérsékleti viszonyok között zajlik majd. Április végén a búzában tömegesen lesz jellemző a szárképződés (szárhasítás) szakasza. Május elején az árpaállományokban egyes mezőgazdasági területeken a

kalászszenzés kezdete is megfigyelhető lesz. A vetett napraforgó- és kukoricaállományokban a vetési időponttól függően a kelés és a kezdeti levélképződés zajlik majd.

Kártevők a kukoricában



Szürke kukoricarészeg (Tanymecus dilaticollis Gyll.)

A kukorica és a napraforgó vegetációjának kezdeti szakaszában az állományokat figyelemmel kell kísérni egy veszélyes kártevő, a szürke kukoricarészeg jelenléte miatt. Ha a kártevő egyedsűrűsége meghaladja a gazdasági károsítási küszöböt (EIL), az állományt első adandó alkalommal be kell permetezni az egyik bejegyzett rovarirtó szerrel (Gazdasági károsítási küszöb a kelési növekedési szakaszban: napraforgó – 2 bogár/m²; kukorica > 2 bogár/m²).



Szőlő lisztharmat (Plasmopara viticola)

A szőlőben a 2-3. levél képződése zajlik, és a legdélebbi régiókban a virágzatok megjelenése. Ebben az időszakban célszerű a szőlőt a lisztharmat és a peronoszpóra kórokozói ellen védekező permetezéssel kezelni.

Növényvédelmi gyakorlatok zöldségfélékben áprilisban

Április végén jelentős minimumhőmérséklet-csökkenés és fagy kialakulásának feltételei várhatók, amit figyelembe kell venni a zöldségpalánták kertbe ültetésekor.