

Мájusban az agrometeorológiai viszonyokat instabil időjárás fogja meghatározni, a hőmérséklet és a csapadékmennyiség a havi klimatikus normákhoz közeli értékekkel.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2025 Брой: 5/2025




A május eleji szokatlanul hűvös időjárás után az első évtized közepére hőmérsékleti viszonyok javulása és a mezőgazdasági növények vegetatív folyamatainak felgyorsulása várható. Az évtized során agronómiai szempontból jelentős csapadék és a talajvízkészlet javulása várható – ez kulcsfontosságú a téli gabonanövények fejlődésének normális reprodukzív fázisai szempontjából. A búzában és az árpa szárának nyújtása, a

kalászszemcse kialakulásának kezdete és a kalászszemzés figyelhető meg, főként az ország keleti és déli régióinak egyes helyszínein. A kukoricában és a napraforgóban a kelés és a kezdeti levélképződés zajlik majd. Az időszak alatt figyelemmel kell kísérni a téli gabonanövényeket kártevők (búzabolha, gabonabogár, zablégy) tekintetében, és ha populációjuk sűrűsége meghaladja a gazdasági károsítási küszöböt, az első adandó alkalommal kezelést kell végezni.

A szőlőültetvényekben figyelni kell az első generációs szőlőmoly hernyók megjelenését és az atkák (sárga szőlőatka) által okozott károkat.

Az időszak alatti gyakori csapadék kedvező feltételeket teremt a gombabetegségek kialakulásához. A szőlőben a peronoszpóra elsődleges fertőzéseinek növekedése várható, ami időbeni megelőző permetezést igényel az időjárás stabilizálódása után.

Május első napjaiban a talajhőmérséklet 10 cm mélységben az ország mezőgazdasági területein megfelelő szinten lesz a melegkedvelő tavaszi növények (gyapot, földimogyoró, bab, görögdinnye, sárgadinnye stb.) vetéséhez.



A második és a harmadik évtized első felében a mezőgazdasági növények fejlődése mérsékelt ütemben fog zajlani. A várható csapadék fenntartja a jó talajvízkészletet és azokat a feltételeket, amelyek mellett a búzában és az árpában a szem képződése és betöltése megtörténik. Ebben az időszakban a téli gabonanövényeknek magasak a talajnedvesség-igényei.

A harmadik évtized második felében várható átlagfeletti hőmérsékletek felgyorsítják a mezőgazdasági növények fejlődését. Május végén az ország keleti és déli régióinak egyes helyszínein megfigyelhető lesz a búza és az árpa tejérettségi stádiumának kezdete.

A kukoricában és a napraforgóban a levélképződés zajlik majd. Az ajánlott agrotechnikai időszakon belül vetett napraforgó május végérik el a rügyezés stádiumát.

Lisztharmat a burgonyafélék családjába tartozó zöldségnövényekben



Májusban a tavaszi fagyok által nem érintett gyümölcstermő növényekben a termésalapzatok kialakulása és növekedése zajlik. A szőlőben a virágzat

elkülönülése figyelhető meg, a hónap végén pedig a virágzás stádiuma. Ezek a stádiumok kritikusak a peronoszpóra és a lisztharmat fertőzés szempontjából.

Rozsdabetegségek a közönséges téli búzában

A májusban várható gyakori csapadék feltételeket teremt számos gombabetegség fertőzési hátterének növekedéséhez: a búzában a rozsdák (barna, sárga) és a Fusarium füvesedés; a peronoszpóra a zöldségnövényekben és a szőlőben.



Barna levélrozsdá a búzában

Az első évtized végén és a második évtized elején nem zárható ki a fagy kialakulásának lehetősége, amit figyelembe kell venni a zöldségpalánták átültetésekor.

Május második évtizedében fokozott jégesőveszély várható. Jégkár esetén célszerű az érintett növényeket az első adandó alkalommal réztartalmú

gombaölő szerekkel kezelni, hogy elősegítsük a sebek gyorsabb gyógyulását és csökkentsük a kórokozók másodlagos fertőzésének kockázatát.

Növényvédelem a szőlőültetvényekben májusban

Májusban folytatni kell a téli gabonanövények kártevőkre (búzabolha, gabonabogár) vonatkozó megfigyelését, és ha populációjuk sűrűsége meghaladja a gazdasági károsítási küszöböt, az első adandó alkalommal kezelést kell végezni.



A szőlőültetvényekben figyelni kell az első generációs szőlőmoly hernyók megjelenését és az atkák (sárga szőlőatka) által okozott károkat.