

Az utolsó májusi héten a mezőgazdasági növények fejlődése a klímái normál alatti hőmérsékletek és gazdaságilag értékes csapadék mellett zajlik majd.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.05.2025 Брой: 5/2025



A következő hétnapos időszakban az agrometeorológiai viszonyokat továbbra is az instabil időjárás fogja meghatározni. Az időszakban agronómiai szempontból jelentős csapadék várható, valamint a talajvízkészlet javulása a mélyebb talajrétegekben is.

A május első és második tíznapjainak csapadékeloszlása egyenetlen volt. Dél-Bulgária számos pontján a májusi csapadék elérte és meghaladta a havi normát (Blagoevgrad, Haskovo, Kardzhali, Elhovo, Chirpan, Karnobat,

Burgas). Az ország déli régióinak egy részében a talajvízkészlet az 50 és 100 cm-es rétegekben elérte és meghaladta a teljes vízkapacitás (TVK) 85%-át, ami optimális a téli gabonafélék és a vetett tavaszi növények fejlődéséhez.

A déli régiókkal ellentétben Északkelet-Bulgária egyes területein (agrometeorológiai állomás, Szilisztrán) az április és május első felében a normál alatti csapadék miatt a téli gabonafélék talajvízkészletének szintje a második tíznap végén alacsony – a TVK 65%-a alatt van.

Május utolsó hetében a talajvízkészlet jelentős javulása várható az északkeleti régiókban, ami nagy jelentőségű a téli gabonafélék számára, amelyek magas követelményeket támasztanak a talaj nedvességtartalma iránt.

Az időszakban a mezőgazdasági növények fejlődése a klimatikus normák alatti hőmérsékleten fog zajlani. Május végéig a téli gabonafélékben a szemképződés és a szemtöltődés folyik majd.



Ezen az interphase periódusban a búzát a gabonabolha lárvái károsítják, ami megkívánja az állományok terepi ellenőrzését, és amikor a kártevő sűrűsége meghaladja a gazdasági kárküszöböt (2 lárva/m²), a kezelést az első lehetőség szerint el kell végezni.

A napraforgóban és a kukoricában a levélképződés zajlik.

Május végén a szőlőben az infloreszcencia virágzása lesz túlnyomó, ami kritikus szakasz a lisztharmat és a peronoszpóra fertőzés szempontjából.

Május utolsó hetében a felső talajrétegek megnövekedett nedvességtartalma korlátozni fogja a szezonális talajművelési műveletek végrehajtását. Az időszakban jégeső várható. A jégeső által károsított gyümölcsfáknál, zöldségnövényeknél és szőlőültetvényeknél célszerű réztartalmú fungicidekkel végezni kezeléseket a kórokozók általi másodlagos fertőzések kockázatának csökkentése érdekében.

Forrás: NIMH