

Agrotechnikai Tevékenységek a Gyümölcsösben Júniusban

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.06.2025 *Брой:* 6/2025



Június legtöbb napján az agrometeorológiai viszonyokat az éghajlati normát meghaladó hőmérsékletek és a havi norma körüli vagy alatti csapadékmennyiség határozza meg. Az átlagos havi hőmérséklet az ország nagy részén 25 és 26 °C között alakul, a Sztruma folyó völgyében hagyományosan valamivel magasabb – körülbelül 27 °C –, Ruse és Vidin térségében pedig 26-27 °C. A hónap legalacsonyabb hőmérséklete 12 °C és 15 °C között, a legmagasabb pedig 32 °C és 35 °C között várható, egyes régiókban akár 37 °C-os értékek is lehetségesek.

A csapadékmennyiség tekintetében az idei hónap várhatóan hasonló lesz májushoz. A normális csapadékmennyiség az alföldeken 40 és 90 l/nm között, az Elő-Balkánon és a hegyvidéken 95 és 100 l között

mozog. A hónap vége felé gyakran megfigyelhető aszály, de idén a száraz időszak a hónap első tíz napos időszakára esik.

Június elején jelentős hőmérséklet-emelkedés és a mezőgazdasági növények fejlődési ütemének gyorsulása várható. Az első tíz napos időszak második felében várható csapadék fenntartja a jó nedvességtartalékot az 50 cm-es és 100 cm-es talajrétegekben. A május végi jelentős esőzés javította a talaj nedvességtartalékait, és a legtöbb szántóföldi területen elérte a szántóföldi kapacitás 85%-át, vagy azt meghaladó szintet.

Az országban napos idő várható, de csak délig; délutánonként csapadék és zivatarok lesznek, helyileg, elsősorban a hegyekben. Nyugat-Bulgária és a hegyvidéki régiók számos helyén délutáni órákban rövid ideig tartó esőzés lehetséges zivatartevékenységgel kísérve. A csapadék valószínűsége alacsonyabb a keleti régiókban és az alföldeken. Az országban a hőmérséklet 28-32 °C között alakul. Viszonylag melegebb légtömeg érkezik, és az első tíz napos időszak közepére a hőmérséklet meghaladja a 32 °C-ot. Jelentős hőmérséklet-emelkedést várunk június 5-9 körül. Ekkor a légkör instabil lesz, és csapadék várható, bár lokalizáltan. A várható hőmérséklet 32-35 °C között alakul. A magas hőmérséklet extrém jelenségek előfeltétele is, különösen Nyugat- és Északnyugat-Bulgáriában, ezeket a jelenségeket valószínűleg nagy méretű jégverés kíséri. Enyhe, de újabb hőmérséklet-csökkenés várható az első tíz napos időszak vége felé.

A június második tíz napos időszakára is a normál feletti hőmérsékleti viszonyok várhatók. A második tíz napos időszak több napsütéses órával kezdődik. Az időjárás összességében túlnyomóan napos és meleg lesz. Jelentősebb csapadéokra június 13. és 17. körül lesznek feltételek. A napok több napsütéses órával indulnak. A délutáni órákban, főként a hegyekben, gomolyfelhők alakulnak ki, és több helyen esni és zivatarozni fog. A csapadék valószínűsége alacsonyabb a Dunai-síkságon és Kelet-Bulgáriában. A nappali hőmérséklet 32-36 °C között alakul, Kelet-Bulgáriában kissé alacsonyabb – 25-30 °C-ig. Június második tíz napos időszakának közepe felé a légkör instabilabbá válik, és több helyen várható csapadék.

Június harmadik tíz napos időszakában a mezőgazdasági növények fejlődése az éghajlati normákhoz közeli hőmérsékleteken megy végbe. A harmadik tíz napos időszak első napjaiban az időjárás instabil lesz, de az időszakra nézve meleg marad. Sok helyen gomolyfelhők alakulnak ki, és délután rövid ideig tartó esők zivatarokkal fognak esni. A hónap utolsó napjaiban a légtömeg stabilizálódása és hőmérséklet-emelkedés várható. Az időszak végére a csapadék csökken, a hőmérséklet emelkedik. Aszályos időszak is várható, kevesebb helyen megfigyelhető csapadékkal. A nappali értékek 32-37 °C között alakulnak.

Gyümölcsfa csemetekertekben

A magágyakat 6-8 kg ammónium-nitráttal vagy ugyanennyi más nitrogénműtrágyával trágyázzák dekáronként, majd megművelik. Szükség esetén öntözést végeznek.

Az anyatelepeket 10-15 kg ammónium-nitráttal vagy ugyanennyi más nitrogénműtrágyával trágyázzák dekáronként, majd feltöltik. Szükség esetén a feltöltés előtt öntözik őket.

A csemetekertekben a sarjakat eltávolítják a dugványok normális növekedésének elősegítése érdekében. Az alanyokat és a csemetekerteket előkészítik a szemzésre.

Gyümölcsösökben

Ügyelni kell arra, hogy az átoltott gyümölcsfák és vad formák ágain lévő kötések ne vágjanak be; szükség esetén időben meg kell lazítani őket. Az anyanövényből nőtt versengő hajtásokat időben el kell távolítani. Az újonnan ültetett fákat rendszeresen művelik. Szükség esetén öntözik őket.

A második tíz napos időszak után a fiatal gyümölcsültetvényeket 15-20 kg ammónium-nitráttal vagy ugyanennyi más nitrogénműtrágyával trágyázzák dekáronként, és sekély talajművelést végeznek.

Palmettás korona kialakításakor a vágásokat akkor hajlíttják meg, amikor azok eléri a teljes hosszúságot: az első szintnél 2 – 2,5 m, a másodiknál 1,5-2 m, a harmadiknál pedig 1 m. Gyengén növekedő fáknál 45-50^o-os szögben, erősen növekedőknél pedig 45-45^o-os szögben helyezik el őket a vízszinteshez képest. Ha egy szinten eltérő hosszúságú vágások vannak, csak az erőset hajlíttják meg, míg a gyengét növekedni hagyják, és később hajlíttják meg.

A barackgyümölcsök gépi ritkítása folytatódik.

Az öntözéssel biztosított területeken zöldtrágyanövények vetését végzik.



Megkezdődik a cseresznye és meggy tömeges betakarítása

Eperültetvényeken

Elültetik a hűtőszekrényben tárolt utolsó eperpalántákat. Folytatódik a fiatal és újonnan ültetett növények gyomlálása. Szükség esetén öntözést végeznek.

A betakarítás folytatódik. Ne szedjünk a nap forró óráiban vagy amikor harmat képződött. Friss fogyasztásra a gyümölcskelyhekkel együtt szedjük.

Melegebb termesztési területeken az utolsó gyümölcsök betakarítása után azonnal összegyűjtik és eltávolítják a szalmát. Az ültetvényeket 8-10 kg ammónium-nitráttal vagy ugyanennyi más nitrogénműtrágyával trágyázzák dekáronként, és elvégzik az első betakarítás utáni művelést. Ha öntözés szükséges, azt a trágyázás előtt végzik el.

Málnaültetvényeken

Rendszeres talajművelést végeznek, és szükség esetén öntözést alkalmaznak. A termő ültetvényekben folytatódik a sorok tisztítása a nagyon gyenge és felesleges sarjaktól. A drótstruktúrát erősen tartják.



Egyes régiókban június közepén kezdődik a korai gyümölcsfajták betakarítása.

Az érés megkezdésekor a méhcsaládokat más ültetvényekre költöztetik, de legalább 5 km távolságra.

Feketeribizli ültetvényeken

A gyökereztető ágyások talaját 2-3 alkalommal művelik az öntözéstől, csapadéktól és a gyomok jelenlététől függően. Rendszeres művelést végeznek mind a fiatal, mind a termő ültetvényeken. A hónap közepe körül megkezdődik a gyümölcsök betakarítása néhány melegebb termesztési területen.

Más növények ültetvényein

Folytatódik a citrom alanyok aktív rügyekre történő oltása.

Folytatódik a gránátalma, füge és homoktövis dugványok gyökereztetésének gondozása szabadföldön, a csemetekertet rendszeresen művelik és öntözik. Elvégzik a szükséges gyomirtó kezeléseket.

A hónap vége felé az előző évi nem oltott alanyokat aktív datolyaszilva rügyekkel szemzik.



Folytatódik a kiviindák segédkarókhöz kötözése. Az éves nitrogén normának utolsó 1/3-ával történik a trágyázás, amelyet a kivihez meghatároztak. A kivi főszárán lévő oldalhajtásokat eltávolítják a fejlődés és az általános alakítás serkentése érdekében. T betű alakúra formázzák.