

Június utolsó dekádjában a tavaszi vetésű növények vegetációja magas hőmérsékleten és talajnedvesség-hiány mellett fog zajlani.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 24.06.2025 Брой: 6/2025



A június közepi magas hőmérsékletek után, amelyek egyes déli régiókban elérték és meghaladták a 35-36°C-ot, nem figyelhető meg változás az agrometeorológiai feltételekben. Az időszak elején várható csapadék gazdasági jelentőség nélküli lesz. A június első és második tíz napos időszakában tapasztalt átlagon aluli csapadék és átlag feletti hőmérséklet miatt a tavaszi vetésű növények talajnedvesség-tartaléka jelentősen lecsökkent. Egyes déli régiókban a kukorica és a napraforgó 50 cm-es rétegében a nedvességtartalék szintje szokatlanul alacsony a nyár elejéhez képest – a szántóföldi kapacitás 60%-a alatt van.

Az előttünk álló időszak legtöbb napján a tavaszi vetésű növények vegetációja a június harmadik tíz napos időszakára vonatkozó éghajlati normák körüli és afeletti hőmérsékleten fog zajlani, és számos mezőgazdasági régióban – talajnedvesség-hiánnyal is. Ez a harmadik egymást követő év éles aszályal a nyári hónapokban, ami káros a kukorica és a napraforgó termésére.

Az időszakban napraforgóban virágzatképzés fog bekövetkezni.



A szürke kukorica-ormányosbogár támadása különösen veszélyes a tavaszi vetésű növényekre. A Sumeni Agrárintézet tudósai felmérést végeztek a kukorica- és napraforgóföldeken Veliko Tarnovo, Targovishte, Ruse, Razgrad és Sumen régiókban, és jelentős károkat fedeztek fel a kártevő okozta.

Kukoricában levélképzés fog bekövetkezni. Június végén a korai kukoricahibrideknél megfigyelhető lesz a címerhányás fázisának kezdete.

Kukorica kártevői

Június harmadik tíz napos időszakában folytatni kell a kukorica vetésforgó ellenőrzését az egyik legveszélyesebb kártevő – a kukoricamoly – jelenlétére, és ha a számok meghaladják a gazdasági küszöböt (10

tojáscsomó 100 növényenként), akkor inszekticid kezelés szükséges a lárvák ellen, mielőtt befúrják magukat a szárukba.

A kukoricamoly (*Ostrinia nubilalis* Hübner) – a kukorica fontos gazdasági kártevője

Az időszakban a mezőgazdasági területeken a búza viasz- és teljes érettsége lesz megfigyelhető. Magashegyi területeken a tejérés és a viaszérésbe való átmenet fog bekövetkezni.

Magas maximum hőmérsékletek és tűzveszély várható a gabonabetakarítás idején.