

Agrotechnikai tevékenységek a gyümölcsösben júliusban

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 06.07.2025 *Брой:* 7/2025



Júliusban a mezőgazdasági növények fejlődése a klímánormák feletti hőmérsékletek mellett fog zajlani. A normál alatti csapadék várható, és a talaj nedvességhiánya fokozódni fog, ami megfelelő öntözési rend alkalmazását teszi szükségessé a mezőgazdasági növényeknél.

A júliusra előrejelzett magas, 38-40 °C feletti maximumhőmérsékletek megzavarják a gyümölcsfélék fiziológiai folyamatainak normális lefolyását.

Az első tíz napban a hőmérséklet várhatóan 3-5 fokkal alacsonyabb lesz a klímánormánál. Az országban a hőmérséklet 28-32 °C között fog mozogni. Nőni fog a gyakoribb csapadék valószínűsége az ország több

területén, nagyobb mennyiséggel, zivatarokkal és jégverésre alkalmas körülményekkel. Több eső várható a hegyvidéki régiókban. A csapadék valószínűsége alacsonyabb a keleti régiókban. A hajlam arra mutat, hogy az év legforróbb hónapjának kezdetén szokatlanul hűvösebb időjárás lesz.

Július második tíz napos időszakában a hőmérséklet emelkedni fog, és a klímánorma körül és felett lesz. A második időszak első napjaiban az ország feletti légtömege instabil marad, és nőni fog a csapadék, zivatarok, sőt jégverés valószínűsége. A hőmérséklet emelkedni fog, és 30-35°C között lesz.

Július harmadik tíz napos időszakában az ország nagyobb részén a csapadék valószínűsége sokkal alacsonyabb lesz. A csapadék valószínűsége magasabb lesz a Duna-menti síkságon és Dél-Bulgáriában. Napos és forró időjárás lesz. 35°C feletti hőmérsékletek várhatók. A hónap vége felé a hirtelen tüzek valószínűsége is növekedni fog.

Gyümölcscsemetekertekben

A magágyakat rendszeresen öntözik és megművelik, hogy a lehető legmagasabb százaléku szabványos alanyanyagot biztosítsák, valamint az anyaultvényeket öntözik és szükség esetén felhalmozzák. A rügyezett fák jó fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében a másodéves csemetekertekben szükség esetén zöldmetszést végeznek. Rendszeres talajművelést és öntözést végeznek, különösen a körte esetében.

Az első éves csemetekertekben elkezdik az alanyok oltását, és azokat, amelyek nem fogadtak el, újra rügyezik. A rügyezést követően körülbelül két héttel ellenőrzik a kötéseket. Azokat, amelyek bevágtak a kéregbe, meglazítják.

Gyümölcsültetvényekben

Folytatódik a vezetőágak lehajlítása a pálmafa formájú fák kialakításakor. Öntözéssel a talaj nedvességtartalmát a teljes víztartó képesség 70%-a felett tartják.

Lemezes ekével, kultivátorral, rotációs talajmegmunkálóval és eltolt szekcióval felszerelt rotációs talajmegmunkálóval a sorok között és a sorban lévő talajfelszínt művelt és gyommentes állapotban tartják, ha a növények közötti terület nincs gyepesítve.

Folytatódik a cseresznye és a meggy betakarítása.



Megkezdődik a sárgabarack és az őszibarack tömeges betakarítása

Eperültetvényekben

Folytatódik az újonnan létesített eperültetvények öntözési gondozása, különösen a júniusban ültetetteké.

Az alacsonyabb és melegebb régiókban, ahol a gyümölcsbetakarítás befejeződött, a szalmát összegyűjtik, eltávolítják és elégetik.



A magasabb és hűvösebb helyeken folytatódik a gyümölcs betakarítása. A szalma eltávolítása után az ültetvényeket előzetes 10-12 kg ammónium-nitrát/dekár trágyázást követően öntözik és megművelik.

A csemetetermelésre szánt anyauültetvényeket öntözik, 15-20 kg ammónium-nitrát/dekárral trágyázzák és kapálják. Azokban az ültetvényekben, ahonnan nem vesznek ültetvényanyagot, kivágják a kúszóhajtásokat.

Kijelölnek és előkészítenek új területeket őszi szabadföldi ültetésre szánt eperültetvények számára. A mélyszántás előtt a területet 2-4 t istállótrágyával, 60-80 kg szuperfoszfáttal és 20-30 kg kálium-szulfáttal trágyázzák dekáronként.

Málnauültetvényekben

Folytatódik az új ültetvények öntözésének és művelésének gondozása. A termő ültetvényeket öntözik és megművelik. Az öntözési norma 50-60 dm³ dekáronként.



A gyümölcs tömeges betakarítását végzik.

Gondoskodnak a málna anyaültvényekről – öntözés és talajművelés, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű ültetvényanyagot – sarjhajtásokat – biztosítsák. Ellenőrzik az ültetvényeket, eltávolítják a más fajták idegen típusú növényeit, valamint kivágják, összegyűjtik és elégetik az öreg, termő hajtásokat.

Feketeribizli ültetvényekben

Folytatódik a sarjtelepek gondozása. A talajt öntözik és megművelik. A fiatal és termő ültetvényekben nem megengedett a gyomtömeg. Az ültetvényeket nitrogéntrágyával trágyázzák (az éves adag 1/3-a).

A gyümölcs tömeges betakarítását végzik. A betakarítás során a későbbi kiirtásra jelölik meg a más fajták idegen típusú növényeit, valamint a beteg és gyenge növényeket. A betakarítás után eltávolítják a törött, alulfejlett és felesleges hajtásokat.

Egyéb növényekkel telepített ültetvényekben

Megjelölik a kívánt fűgefajtákat és formákat dugványok nyeréséhez.

Dugványokat nyernek aktinídiából (kiwiből), babérből, aróniából, homoktövisből és gránátalmából gyökérezés céljából, mesterséges ködöléssel felszerelt üvegházban.

Elkészítik a dugványokat. A dugványokat indolvajsav oldattal kezelik 5 másodpercig. Két rész perlit és egy rész tőzeg talajkeverékben gyökeresítenek őket mesterséges ködöléssel felszerelt üvegházakban.

Megkezdődik a kaukázusi datolya szilva alanyoknak japán datolya szilvával, valamint az aktinídia csemetéknek termesztett fajtákkal való oltása. Folytatódik az aktinídia kúszónövények dróttartóhoz kötözése. Az aktinídia nyári metszését végzik. A jujubát és a pisztáciát rügyezik.



Fügegyümölcsöt takarítanak be

Homoktövis – egy kevésbé ismert, de ígéretes gyümölcstermő növény

A hónap vége felé megkezdődik a homoktövis és az arónia gyümölcsének betakarítása.