

Július végén csökkennek a hőmérsékletek, a csapadék és a jégeső kialakulásának feltételei.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 27.07.2025 Брой: 7/2025



Július utolsó hetében továbbra is a forró időjárás határozza meg az agrometeorológiai viszonyokat. A 40°C-ot elérő és meghaladó rendkívül magas hőmérsékletek tovább rontják a tavaszi gabonák állapotát, amelyek fiziológiai stresszbe kerültek.

Északkelet-Bulgáriában (Szilisztra és Provágia agrometeorológiai állomások) az aszály fokozódása és a júliusi átlagnál magasabb hőmérsékletek következtében a kukoricaállomány egy része idő előtt befejezi vegetációját, és nem kerül betakarításra.



Dél-Bulgáriában a napraforgóállományoknál a szokásos időszakoknál korábban figyelhető meg az érési fázis (Plovdiv, Haskovo, Jambol). A nedvességhiány következtében a napraforgóállomány nagy része kis, rosszul töltött koszorúval rendelkezik. A korai kukoricahibrideknél, öntözés mellett természetesen, a tejérettségi fázis figyelhető meg.

Július utolsó napjaiban hőmérséklet-csökkenés, csapadék és az agrometeorológiai viszonyok kedvező változása várható.

Az időszak közepén jégesésre alkalmas időjárás várható – újabb kihívás a mezőgazdasági növények számára. A jégesés által károsított zöldség- és gyümölcsstermeszterményeket előnyösen réztartalmú fungicidekkel kell kezelni a lehető legkorábbi alkalommal az esemény után.

A hivatalos adatok szerint a búzabeta- rítás a Dobrich megyei régióban a befejező szakaszban van, és a szeszélyes tavasz és a hosszú aszály ellenére a régió gazdái sikeres kampányra számítanak.

Eddig a legmagasabb hozamokat a General Toshevo községben 684 kg/dka-val, ezt követve a Krushari községben 649,7 kg/dka-val, valamint a Balcsik és Kavarna községekben 630 kg/dka-val jelentették.

A Dobrudzsai Mezőgazdasági Intézet területein is folyik a betakarítás, és a tavalyi évhez képest jobb hozam várható. A szelekciónak kulcsszerepe van a jó eredményekben, jelentette az igazgató, doc. Ilija Iliev. Ezen kívül

az Intézet idén részt vett egy programban a talajállapot javítására további, a talaj egészségét elősegítő termékekkel, aminek szintén hatása van. Ha a növények kiegyensúlyozott táplálása is biztosított, az eredmény nem marad el.

A Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztérium 2025-ös termés betakarítás előtti búza- és árpa hozam-előrejelzése szerint a búzatermelés várhatóan 6,6–7,1 millió tonna, az árpatermelés pedig 0,9–1,2 millió tonna lesz.



A Dobrics megyei régióban az árpabetakarítás befejeződött, és a kelet-bolgárországi helyeken elért árpa hozam meghaladja a 600 kg/dkát (Szilisztra agrometeorológiai állomás – 700 kg/dka, Balcsik, Kavarna és General Toshevo – körülbelül 700 és 700 kg/dka felett).

A jó eredmények ellenére, és annak ellenére, hogy az elmúlt évek stresszes éghajlati viszonyai között, az érdeklődés ez iránt a növény iránt még mindig nem növekszik.

A jó hír, hogy a jelenlegi gazdálkodási évben az árpaállomány összesen 154 000 dka, tavalyhoz képest – 137 000 dka.

A gazdák választhatnak a külföldi és a bolgár nemesítés között, amely rendkívül jó takarmány- és sörárpa-fajtákat kínál a piacon. Az elmúlt években a Dobrudzsai Mezőgazdasági Intézet és a Karnobati Mezőgazdasági

Intézet nemesítői nagy hozamú, nagy plaszticitású fajtákat fejlesztenek, amelyek különböző éghajlati viszonyokhoz és régiókhoz alkalmasak. Néhányuk bekerült a szomszédos országok, például Moldova, Észak-Macedónia és Törökország fajtajegyzékébe. A bolgár nemesítésre jellemző a magas aszálytűrés kombinálva a magas téli keménységgel, és jól kezeli az olyan problémákat, mint a fekvés és a gazdaságilag jelentős betegségek.



A Dobrudzsában a búzabetakarítással párhuzamosan a levendula betakarítása is folyik, a legnagyobb területek az aromás növény alatt General Toshevóban találhatók – több mint 8000 dka. Jelenleg a hozam ott körülbelül 300 kg/dka.

A jelen évben a levendulaföldek összes száma közel 20 000 dka, míg tavaly összesen 27 000 dkát takarítottak be. A lila virágzás 2016-os tömeges fellendülése után, amikor az illóolajos növény 100 000 dka területet borított, jelenleg éles visszaesés figyelhető meg a termesztésében. Idén Dobrudzsában csak 90 dka új ültetvényt hoztak létre.

Kazanlakban és Pavel Banjában is megkezdődött a kampány, az átlagos hozam 280 és 320 kg/dka között van.

Ennek az illóolajos gyógynövénynek a termesztésében a vezető tényező a levendulaolaj minősége és ára. A levendula olajhozama elsősorban a fajtától, de az éghajlati viszonyoktól, a termesztési technológiától és a betakarítási időszaktól is függ. Így száraz és forró időben az olaj a virágzatban halmozódik fel, míg hűvös és

esős körülmények között az olajhozam alacsony. Az illóolajok piaca az elmúlt években meglehetősen dinamikus volt, és ha 7 évvel ezelőtt a levendulaolaj kilogrammonkénti ára 250-300 BGN között mozgott, a következő évben nem tudták meghaladni az 50 BGN-t kilogrammonként. Kivételt az árban csak az ökológiailag tanúsított termelők jelentettek, ami megerősíti a minőség-piac arányt.