


A késői mezőgazdasági növények fejlődésének augusztusi korlátozó tényezője továbbra is a talajnedvesség hiánya.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.08.2025 Брой: 8/2025



Augusztusban az agrometeorológiai viszonyokat a klímai normák feletti hőmérsékletek és a havi normától körülbelüli vagy alatti csapadék határozza meg. A talajnedvesség hiánya továbbra is korlátozó tényező marad a késői mezőgazdasági növények fejlődésében augusztusban is.

A július végén, az aszály fokozódása után hullott csapadék helyi jellegű volt és nem volt elegendő a nedvességhiány leküzdésére a késői mezőgazdasági növényeknél. A vetésterületek nagy részén a 50 és 100 cm-es talajrétegekben hiányzik a termelékeny nedvesség.

Augusztus napjainak nagy részében az előrejelzett viszonylag száraz időjárás miatt megnövelt öntözési normák alkalmazása lesz szükséges a második növények és a késői kukoricahibridek esetében. Megnövelt öntözési normákra lesz szükség a gyümölcsfák esetében is, amelyek a következő évre vonatkozó virágrügyeiket formálják.

A DAI új generációs napraforgó hibridjei egy kiválóan intenzív formátumot kínálnak a hozamirányítás terén

Augusztusban, a szokásos országos időkereteknél korábban fejeződnek be a késői tavaszi növények fejlődési fázisai. Augusztus elején Dél-Bulgária napraforgó állományainál (Plovdiv, Haskovo, Sliven, Yambol) technikai érettség figyelhető meg, az első dekád végén és a második dekád elején pedig a vetésterületek nagy részén is. Az öntözés mellett termesztett korai kukoricahibridek az első dekádban lépnek viasz- és teljes érettségi fázisba. A közepes-késői hibridek fejlődésük befejezését augusztus harmadik dekádjára várják.

A nyár első felében uralkodó kedvezőtlen agrometeorológiai viszonyok, a hosszú aszály és a rendkívül magas hőmérsékletek miatt alacsony kukorica- és napraforgóhozamok várhatók.

A júliusban tapasztalt magas hőmérsékletek, amelyek augusztusban is folytatódnak, komoly fenyegetést jelentenek a tavaszi növények betakarítására.

Az ország egyetlen napraforgó nemesítőközpontja a Dobrudzsai Mezőgazdasági Intézet, ahol a nemesítési erőfeszítések az új, varasodással, lisztharmattal és aszályal szemben rezisztens napraforgófajták kifejlesztésére összpontosulnak. Az Intézet egyik új hibridje – a „Dara”, amely az „Express” technológia alkalmazására alkalmas, és a 731-es fajtáig lisztharmat-, valamint a G fajtáig varasodás-rezisztens, kiválóan teljesít aszályos és magas hőmérsékletű viszonyok között.

Augusztusban 35–40°C közötti maximum hőmérsékletek várhatók. Ezek az értékek negatív hatással lesznek a késői termesztésű zöldségnövények (uborka, zöldbab, cukkini) virágzására és termékenyülésére.

A hónap során a meteorológiai viszonyok korlátozzák a gombabetegségek terjedését, kivéve a lisztharmatokat a zöldségnövényeken, gyümölcsfákon és szőlőben. A atkák populációjának növekedése várható.

Szőlőültetvényekben szükséges figyelemmel kísérni a szőlőmoly harmadik nemzedékének hernyóinak egyedsűrűségét. Ahol szükséges, augusztusi növényvédő permetezést a nap hűvösebb óráiban (25°C alatti

hőmérsékleten) kell végezni, a betakarítás előtti várakozási idővel rendelkező, a növények érési idejéhez igazodó termékek alkalmazásával.

Forrás: NIMH