

Agrotechnikai tevékenységek a gyümölcsösben augusztusban

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 07.08.2025 *Брой:* 8/2025



Augusztusban befejeződött a hajtások növekedése. Az őszi alma-, körte- és barackfajták termései intenzíven növekednek, párhuzamosan pedig zajlik a termőrügyek differenciálódásának folyamata. A fákat tartalék tápanyagokkal látják el.

A hónap agrometeorológiai feltételeit a klímanorma körüli és feletti hőmérsékletek fogják meghatározni.

Augusztusban 35-40°C közötti maximum hőmérsékletek várhatók. A hónapban a növényfejlődés korlátozó tényezője továbbra is a talajnedvesség hiánya marad.

A második évtized elején az időjárás továbbra is főleg napos marad, délután erős felhőzettel. A hőmérséklet a klímanormához közel lesz — 31 és 34°C között. Szeles lesz a Duna-menti síkságon. Augusztus 13–15. és 17–22. környékén egy új hidegfront áthaladása várható, amely hőmérséklet-csökkenéshez, csapadékhoz és zivatarokhoz vezet. A rövid lehűlés után az évtized végéig ismét felmelegedés lesz, de megnövekedett délutáni csapadékvalószínűséggel. A hónap végéig tartós hőmérséklet-csökkenés várható.

Augusztus legtöbb napján az előrejelzett viszonylag száraz időjárás megnövelt öntözési normák alkalmazását igényli a késői gyümölcsfafajtáknál.

Gyümölcsfaiskolákban

A magágyakat megművelik és öntözik.



Alanyok oltása rüggyel

Az elsőéves iskolai ágyásokon folytatódik az alanyok rüggyel való oltása. A másodéves iskolai ágyásokon, ha szükséges, az alanyok utolsó rüggyeltávolítása történik az oltási pont alatt.

A szaporítóanyag ültetvényeket ellenőrzik és minden eltérő típust kiirtanak. A helyeket azonnal feltöltik a fő fajta növényeivel.

Augusztus végéig lehet oltani alma-, körte-, barack- és cseresznyefákat. A hónap második és harmadik évtizedében megkezdődik a birs oltása.

A júliusban rüggyel oltott alanyokat ellenőrzik, és ha az oltvány és az alany jó összeforrt, eltávolítják a kötéseket.

Gyümölcsösökben

Figyelik a talajnedvességet és szükség esetén öntöznek. Eső vagy öntözés után sekély talajművelést végeznek a képződött kéreg feltörésére.

Mechanikai gyomirtást végeznek a sorok között, ha azok nincsenek gyepesítve, valamint a famellékeken.



Folytatódik a barackok, valamint a korai alma-, körte- és szilvafajták betakarítása. A hónap végén egyes korai diófajták termését is learatják.

Elvégzik a szükséges szervezési munkát a középkorai és késői alma-, körte- és szilvafajták betakarítására való felkészüléshez.

A gyümölcstárolókat fertőtlenítik és felkészítik az új termés fogadására. A gyümölcssorba állító gépeket megjavítják és üzemkész állapotba hozzák.

Megkezdődik az új gyümölcsösök létesítésére szánt területek ültetés előtti előkészítése — mélyszántás, alaptrágyázás és egyengetés.

Eper ültetvényekben



Nagyon fontos, hogy minden eperültetvényt időben öntözzenek. Nem szabad megengedni a levelek kiszáradását. Augusztusban a növények alakítják ki a következő évi termést, és optimális vízháztartást kell biztosítani. Az ültetvény korától és a talajtípustól függően 2-3 öntözést végeznek. Levágják azon növények indáit, amelyekből nem szándékoznak ültetési anyagot nyerni.

Gondoskodnak a szaporítóanyag ültetvényekről — gyomirtás, öntözés és talajművelés.

Folytatódik az új területek előkészítése az eper őszi ültetésére. Néhány magasabb régióban meg is kezdődhet az ültetés.

Málna ültetvényekben

Folytatódik az újonnan létesített ültetvények gondozása — szükség esetén öntözznek, és ha gyomok vannak, művelést végeznek. A termő ültetvényeket öntözik, hogy a termések növekedni tudjanak és kialakulhassanak a

következő év terméséhez szükséges virágrügyek. A hónap végéig beszüntetik az öntözést, hogy az új pótlószárok beérjenek.

Folytatódik a szaporítóanyag ültetvények gondozása — öntözés, nitrogéntartalmú műtrágyákkal történő utántrágyázás és talajművelés. Augusztus végéig beszüntetik az öntözést, hogy a szárok beérjenek.



Folytatódik a betakarítás. A hónap végéig minden termőszárat kivágnak, eltávolítanak és elégetnek.

Előkészítik az őszi létesítésre szánt új ültetvények helyeit. A talajt 3-5 tonna istállótrágyával, 80-100 kg szuperfoszfáttal (vagy ugyanennyi más foszfortartalmú műtrágyával), 25-30 kg kálium-szulfáttal (vagy ugyanennyi más káliumtartalmú műtrágyával) trágyázzák meg holdanként.

Feketeribizli ültetvényekben

Folytatódik a sarjtelepek és fiatal ültetvények gondozása. Nem megengedett a talaj kiszáradása és gyomosodása. Ha a sarjtelepekben és fiatal ültetvényekben a növények gyengén növekednek, 10-15 kg ammónium-nitráttal (vagy ugyanennyi más nitrogéntartalmú műtrágyával) történő utántrágyázást végeznek holdanként.



A magasabb fekvésű területeken befejeződik a termés betakarítása. Az ültetvényeket öntözik és rendszeresen művelik.

Egyéb kultúrákat tartalmazó ültetvényekben

Végzik a datolyaszilva, aktinídia (kiwi), jujuba és pisztácia alanyainak nyári rügypoltását. 5-6 nappal az oltás előtt az iskolát bőségesen öntözik a jobb kéregcsúszás érdekében.

3-5 nappal a rügypoltás előtt gyűjtik be az oltóanyagot és hűvös helyiségben, árnyékban tartják.

Ellenőrzik a datolyaszilva és egyéb növények rüggyel oltott példányainak eredményességét.

A citromot nyugvó rüggyel oltják. A citrom palántákat egy héttel az oltás előtt és közvetlenül utána bőségesen öntözik.

Folytatódik a füge, gránátalma stb. kívánt fajtáinak és formáinak kijelölése.

Folytatódik az aktinídia, az aronia, a homoktövis és a gránátalma zölddugványainak gyökeresedése.

Folytatódik a déli gyümölcsöket tartalmazó ültetvények öntözésének és kapálásának gondozása, különös figyelmet fordítva az újonnan létesítettekre.

Folytatódik a füge, homoktövis és aronia termésének betakarítása.