

Szeptemberben nem várható mezőgazdasági szempontból jelentős csapadék, és a körülmények lehetővé teszik a késői zöldségfélék további termésének kialakulását.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.09.2025 Брой: 9/2025



Szeptemberben az agrometeorológiai feltételeket a klímai normák feletti hőmérsékletek, valamint a havi norma körüli és az alatti csapadékmennyiség fogja meghatározni.

A kialakult aszályt követően az augusztus végi csapadék helyi jellegű volt, és csak bizonyos területeken, a középső és keleti régiókban nedvesítette meg a

talaj felső rétegét. A művelés alá vont területek nagy részén a 50 és 100 cm-es talajrétegekben hiányzik a termelői nedvesség.

Szeptember első és második tíz napos időszakában nem várható agronómiai jelentőségű csapadék, és a művelés alá vont területek számos helyén a száraz és tömörödött talaj megnehezíti a mélyszántást és a repcevetésre tervezett területek vetés előtti talajművelését. Nagyon valószínű, hogy komoly késések lépnek fel ennek az olajos takarmánynövénynek a vetésében, amely pontos agrotechnikát igényel. A repce vetésének agrotechnikai időszaka augusztus végétől szeptember második tíz napos időszakának végéig tart.



Szeptemberben a előrejelzett, a normál feletti hőmérsékleti viszonyok felgyorsítják a késői mezőgazdasági növények fejlődésének utolsó szakaszait, amelyek túléltek a hosszú nyári aszály kedvezőtlen hatásait. A hónap elején az öntözés mellett termesztett középérésű kukoricahibridék viasz- és teljes érettségi, míg a késői hibridék a tej- és viaszérettség közötti átmeneti állapotban lesznek.

A hónap napjainak nagy részén a nyár végére és az ősz elejére előrejelzett viszonylag száraz és meleg időjárás megfelelő feltételeket biztosít a

szőlőtermés betakarításához. A nyári, a normál feletti hőmérsékletek következtében a késői borászati szőlőfajták a szokásos időpontoknál korábban érik el a technológiai érettséget.

A szeptemberi meteorológiai viszonyok korlátozzák a gombabetegségek terjedését, kivéve a lisztharmatokat. A késői szabadföldi termesztésű zöldségnövények esetében nem szabad elhanyagolni a atkák, a káposztamoly és a gyapottok-bagolylepke elleni növényvédő permetezést, amelyek kárt okoznak és rontják a zöldségtermés minőségét.

A hónap folyamán a kártevők nagy részének káros tevékenysége a gyümölcstermő növényeken véget ér. Szeptember végén célszerű ellenőrizni a körteültetvényeket a körte rügypúró jelenléte szempontjából. Ennek a kártevőnek a védekezése csak az ősz elején, a kifejlett egyedek ellen hatékony. Ha a kártevő sűrűsége meghaladja a gazdasági kárküszöböt (3 bogár faonként), kezelést kell végezni.

A nyári, a normál feletti hőmérsékletek következtében a tavaszi fagyok által nem érintett korai őszi gyümölcstermő fajták egy része eléri a betakarítási érettséget (alma: Golden Parmena, Jonathan, Red Delicious, Golden Delicious, Canadian Reinette stb.).

Szeptemberben nem várhatóak kritikus minimumhőmérsékletek, és a feltételek lehetővé teszik további termés képződését a fagyérzékeny késői zöldségnövények esetében.