

November második felében lesznek feltételek a szezonális agrotechnikai tevékenységek elvégzésére és gyümölcsfák ültetésére

Автор(и): Растителна защита

Дата: 09.11.2025 Брой: 11/2025



Az agrometeorológiai viszonyokat novemberben az éghajlati normához közeli és afölötti hőmérséklet, valamint a hónapra jellemző normához közeli és alatti csapadék határozza meg.

November első tíz napjának végére, illetve a második tíz napjának elejére az agrometeorológiai viszonyokat labilis időjárás határozza meg. Az elmúlt hét nap végén hullott és a következő hétre várható csapadék tovább késlelteti, az agrotechnikai határidőkön túl, a búza vetését. Eddig a tervezett területek mintegy fele került elvetésre.

Az októberi csapadék, amely két-háromszorosán is meghaladta az éghajlati normát (Szófia, Pleven, Lovecs, V. Tarnovo, Razgrad, Rusze, Pazardzsik, Sztara Zagora, Burgasz), magas nedvességtartalmat tartott fenn a felső talajrétegekben, ami késleltette a vetés előtti művelést és az őszi gabonafélék vetését. Ezen objektív ok miatt az ország nagy részén, kivéve a Duna-síkság és a keleti régiók egyes területeit, az októberi búza vetésének agrotechnikai határidői elmaradtak. Az őszi gabonafélékre tervezett területek jelentős részét novemberben vetik el. Nagy a valószínűsége annak, hogy a novemberi vetések őszi vegetációjuk végére nem érik el a bokrosodási fázist, a telelésre alkalmas fázist.

November legtöbb napján az átlagos napi hőmérséklet a normál felett várható, ami fenntartja az őszi vetések aktív vegetációs folyamatait. A hónap végén a búza és az árpa különböző fázisai lesznek megfigyelhetők, a vetési időtől függően. A novemberben vetett növényeknél csírázás és levélfejlődés (1-2-3 levél) fog bekövetkezni. A Duna-síkság egyes területein és a keleti régiókban (Dobrics, General Tosevo, Tervel, Provadia, Karnobat) korán ősszel vetett búza vetésterületek kis részén megfigyelhető lesz a bokrosodási fázis kezdete.



*A gabonafélék legveszélyesebb kártevője a közönséges gabonaszár-bogár (*Zabrus tenebrioides*), amely megtámadja a búzát, árpát, kukoricát, zabot és számos gabonafűfélélt.*

A búza és az árpa vegetációjának kezdeti fázisaiban fel kell mérni a kártevőket. A károkat a közönséges mezei pocok, a gabonaszár-bogár lárvái és a gabonalegyek okozzák, és ha a sűrűség meghaladja az EIL-t (Gazdasági Kártételi Küszöb), időben történő növényvédelemre van szükség.



Novemberben a második tíz nap folyamán kedvezőbb feltételek alakulnak ki a gyümölcsfák ültetésére és a gyümölcstermesztésben végzett növényegészségügyi tevékenységekre. Az almatermésű fajok (alma, körte) varasodásos betegsége esetén 5%-os karbamidoldattal történő kezelés javasolt. Csonthéjas gyümölcsfajok esetén 2%-os bordói lével javasolt permetezni a lyukas levelűség, a korai barnulás és az őszibarack levélfodrosodása kórokozói ellen.