

December – szokatlanul magas hőmérsékletek és helyi csapadék

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.12.2025 Брой: 12/2025



A november nagy részében uralkodó, évszakhoz képest meleg időjárás és a nagyon jó talajnedvességtartalékok kedvező feltételeket teremtettek a későn vetett, agrotechnikai határidők után beültetett őszi növények fejlődésének előrehaladásához.

December elején az előre jelzett, átlag feletti hőmérséklet meghosszabbítja az őszi gabonafélék vegetációs folyamatait az ország szántóföldi régióiban.

Az időszak elején várható kiterjedt csapadék növeli az őszi nedvességtartalék szintjét a 100 cm-es talajrétegben. Az októberi és novemberi átlag feletti csapadékmennyiség miatt a téli vetések talajnedvesség-

tartaléka az egy méteres rétegben a legtöbb szántóföldi régióban elérte a FK (szántóföldi kapacitás) 90%-át.

Az évtized végén az agrometeorológiai viszonyokat továbbra is az évszakhoz képest magas hőmérséklet határozza meg. A keleti régiókban 14-15°C feletti maximumértékeket prognosztizálnak, ami kiválthatja egyes korán virágzó gyümölcsfajok nem kívánt, idő előtti rügyduzzadását, ami fagyállóságuk csökkenéséhez vezetne.

A hónap első évtizedének második felében megfelelő feltételek alakulnak ki az őszi növényvédelmi permetezések befejezéséhez a gyümölcsfákon az áttelelő kórokozók és kártevők ellen.

Hőmérsékletcsökkenés, a vegetáció mérséklődése és leállása várható búza és árpa esetében december első évtizedének végén.

A második és a harmadik évtized elején az előre jelzett átlagos napi hőmérsékletek meghaladják az éghajlati normákat, de olyan határokon belül maradnak, amelyek az őszi gabonaféléket nyugalmi állapotban tartják.

A tél elején a búza esetében a harmadik leveles állapot lesz a domináns. Az ország egyes keleti és távoli déli régióiban az időben – októberben – vetett növények kis része a bokrosodási fázisban lesz, alkalmas az áttelelésre. A november második felében későn vetett őszi gabonafélék fejletlenül, a levélképződés kezdeti szakaszában (1-2 levél) mennek majd télbe. A növények fenológiai állapotában mutatkozó jelentős különbségek oka a kedvezőtlen őszi kezdeti viszonyok – az aszály és az azt követő, átlag feletti októberi csapadék – miatti késleltetett vetés.

December végére hőmérséklet-emelkedés várható, de átlagos napi értékei az őszi növények vegetációs folyamatainak újraindulásához szükséges biológiai minimum alatt maradnak.

A hónap során az előre jelzett, mínusz 10°C-ig terjedő minimum hőmérsékletek hóborítás nélküli körülmények között, hosszabb ideig tartva, kritikusak lesznek a levélképződés kezdeti szakaszában lévő növények számára.

A decemberi, a havi normához közeli várható csapadék növeli a nedvességtartalékokat a 100 cm-es talajrétegben a FK (szántóföldi kapacitás) szintjéhez közel.