

Februárban az agrometeorológiai viszonyok a téli és tavaszi időjárás között váltakoznak.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.02.2026 Брой: 2/2026



A január végén és február elején uralkodó enyhe időjárás után az agrometeorológiai viszonyok ismét télies jellegűek lesznek.

A várható lehűlés a déli és keleti régiókban visszaállítja az őszi vetésű növények nyugalmi állapotát, és gátolja néhány korai virágzású csonthéjas gyümölcsfaj idő előtti rügyduzzadását.

A várható hócsapadék hóréteget képez, amely védelmet nyújt a késői vetésű őszi gabonák számára a előrejelzett, akár mínusz 11-12°C-ot is elérő alacsony minimumhőmérsékletekkel szemben. Ezek az értékek

hórétteg hiányában és hosszabb ideig tartva kritikusak lehetnek az 1-2 levél stádiumban áttelelő növények egy részére (Nikolaevo Mezőgazdasági Állomás).

Az első félidőszak második felében és a második tíz napos időszak alatt az agrometeorológiai viszonyokat a klimatikus normák körüli és azokat meghaladó hőmérsékletek határozzák majd meg. A legtöbb szántóföldi régióban, Dél-Bulgária és a Fekete-tenger partvidéke mentén fekvő területek kivételével, a várható napi átlaghőmérséklet nem haladja meg azt a biológiai minimumot, amely az őszi gabonák vegetatív folyamatainak újraindulásához szükséges.

Február harmadik tíz napos időszakában jelentős hőmérséklet-emelkedés várható, és a keleti és déli régiókban kedvező feltételek alakulnak ki az őszi vetésű növények késleltetett vegetációjához. A hónap végére a búzánál a harmadik levél stádium lesz túlnyomó. A Duna-síkság, a legkeletibb és délnyugati régiók (Novachene, Szilisztra, D. Chiflik, Karnobat, Sandanszki) egy részén a növények a bokrosodás stádiumában telelnek át.

A harmadik tíz napos időszakban várható, a normál feletti hőmérsékletek idő előtti fejlődést idézhetnek elő néhány korai virágzású csonthéjas gyümölcsfajban (mandula, kajszibarack, őszibarack) az ország déli régióiban.

Februárban a várható, a normál feletti csapadék növeli a talaj nedvességtartalmát a két méteres rétegben. A talaj egyméteres rétegében a nedvességtartalék január végén a legtöbb szántóföldi régióban, Kelet-Bulgária egyes területei (Razgrad, Ts. Brod, D. Chiflik, Szilven, Chirpan) kivételével, a mezői vízkapacitás szintjét érte el.

Februárban a hónap második felében kedvezőbb feltételek alakulnak ki a szőlőültetvények és gyümölcsültetvények metszésére, a harmadik tíz napos időszakban pedig az őszi vetésű növények nitrogén tartalmú ásványi műtrágyákkal történő utántrágyázására, valamint a korai tavaszi növények (borsó, bükköny, zab, tavaszi árpa) vetésére előkészített területek elővetési talajművelésére.

A nitrogéntartalmú műtrágyák kijárási tilalmának határidejei

Ne feledkezzünk meg azokról az időszakokról, amikor a Víz törvény 2. "A vizek nitráttal való szennyezés elleni védelme mezőgazdasági forrásokból" című fejezete értelmében tilos nitrogéntartalmú műtrágyák kijárása szántóföldi és állandó növényekre, gyümölcsültetvényekre, rétekre és állandó legelőkre. Ez a követelmény különösen fontos az "Agroökológia és klíma" és a "Biológiai gazdálkodás" intézkedések kedvezményezettjei, valamint minden olyan gazdálkodó számára, akiknek földje nitrátérzékeny zónákba esik. Kötelesek betartani a Nitrát Irányelvet és a jó gazdálkodási gyakorlat szabályait.

A követelmények szerint meghatározott időszakok vannak, amikor tilos a nitrogéntartalmú műtrágyák kijárása:

- Dél-Bulgáriára ez az időszak november 1-től február 20-ig tart, és magában foglalja a Blagoevgrad, Burgasz, Kardzsali, Pazardzsik, Plovdiv, Szilven, Szmoljan, Sztara Zagora, Haszkovo, Jambol, Szófia-város, Szófia-tartomány, Pernik és Kjusztendil körzeteket;
- Észak-Bulgáriára az időszak november 1-től február 25-ig tart, és magában foglalja a Várna, Vraca, Veliko Tarnovo, Vidin, Gabrovo, Dobrics, Lovecs, Montana, Pleven, Razgrad, Ruszé, Szilisztra, Targoviste és Sumen körzeteket;
- November 1-től február 5-ig nem megengedett az őszi vetésű egyéves növények trágyázása;
- November 1-től február 25-ig – a vetésre és ültetésre előkészített, üresen álló területeken;
- Új gyümölcsültetvények létesítésekor nitrogéntartalmú műtrágyákat november 15-től február 25-ig nem alkalmaznak.

A nitrogéntartalmú műtrágyák (beleértve a szerves és ásványi műtrágyákat) éves normája legfeljebb 17 kilogramm hatóanyag holdanként. A gazdálkodók kötelesek trágyázási naplót vezetni, amelybe feljegyzik a trágyázási normát, a kijuttatott műtrágyák nevét, típusát és mennyiségét, valamint a előzetes talajvizsgálatok eredményeit és a trágyázási szakemberek ajánlásait.