

Március elején a felső talajrétegek magas nedvességtartalma akadályozni fogja a korai tavaszi növények vetését.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2026 Брой: 3/2026



Március első tíz napjában az agrometeorológiai viszonyokat az átlag feletti hőmérsékletek határozzák majd meg. A hónap elején előrejelzett meleg időjárás, a 15-16°C feletti maximumértékekkel, aktiválja a vegetatív folyamatokat az őszi vetésű növényekben és a gyümölcsfélékben az ország mezőgazdasági területein. Ebben az időszakban a búzaféléknél az északnyugati régiókban a harmadik levélstádium lesz jellemző, míg a keleti és déli régiókban a szárhasadás dominál.

A gyümölcsféléknél, a kritikus minimumhőmérsékletek veszélye nélkül, a rügyduzzadás és a rügypattanás stádiuma következik be a korai virágzású csonthéjas gyümölcsfajoknál a déli régiókban.

Az időszak alatt nem várható jelentős csapadék. A februárban megfigyelt átlag feletti csapadékmennyiség miatt a talaj nedvességtartaléka a 100 cm-es rétegben a legtöbb mezőgazdasági régióban elérte a Tározó Kapacitás szintjét. A déli régiók egyes részein, ahol a csapadék a havi normát két-háromszorosán meghaladta (Szlivén -111 l/m², Szent Zagora - 130 l/m², Haszkovo - 155 l/m², Kardzsali - 150 l/m², Elhovo - 121 l/m², Csirpan - 118 l/m²), a téli gabonafélék túl nedvesek.



A közelgő időszakban is a felső talajrétegek magas nedvességtartalma Dél-Bulgária számos helyén megnehezíti az őszi vetésű növények nitrogén tartalmú ásványi trágyázását, valamint a tavaszi vetésre szánt területek előkészítő művelését a korai tavaszi növények (borsó, bükköny, tavaszi árpa) vetése előtt.

Az első tíz nap végén várható rövid lehűlés után a második tíz nap legtöbb napján a napi átlaghőmérséklet a téli gabonafélék vegetációjához szükséges biológiai minimum feletti lesz.



Március harmadik tíz napjában a mezőgazdasági növények fejlődése a klimatikus normákhoz közeli hőmérsékletek mellett fog zajlani. A hónap végére a búzánál a szárhasadás stádiuma lesz jellemző. Az agrotechnikai határidőn belül vetett téli gabonaféléknél a szárhasadási együttható növekedése figyelhető meg.

Március folyamán a gyümölcsfélékben a következő fejlődési stádiumok következnek be: rügyduzzadás, rügypattanás, bimbóképződés és virágzás a korai virágzású csonthéjas gyümölcsfajoknál (mandula, kajszibarack, őszibarack, cseresznye). A hónap során előrejelzett, -7°C -ig terjedő minimumhőmérsékletek kritikusak lehetnek a bimbóképződés és virágzás stádiumába lépett gyümölcsfák számára.

A márciusra várható, a havi normákhoz közeli csapadékmennyiség jó talajnedvesség-tartalékot biztosít a téli gabonafélék számára. A februárban megfigyelt átlag feletti csapadék (Sumen -103 l/m², Razgrad -104 l/m², Ruszé - 103 l/m², Szilisztra - 100 l/m², Dobrics - 98 l/m², Haszkovo - 155 l/m², Kardzsali - 151 l/m², Szlivén -111 l/m², Szent Zagora - 130 l/m², Elhovo - 123 l/m², Csirpan - 119 l/m²) miatt az őszi vetésű növények számára a 100 cm-es talajréteg nedvességtartaléka a Tározó Kapacitás szintjéhez közelít.

Március közepén (15-20.03) kezdődik Dél-Bulgáriában a napraforgó vetésének agrotechnikai időszaka, a harmadik tíz nap közepén (25.03–5.04) pedig a Duna-menti Alföldön.