

Veszélyes szőlőbetegség: a BABH karanténintézkedéseket vezet be

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.03.2026 Брой: 3/2026



A Bolgár Élelmiszer-biztonsági Hatóság (BFSA) karantén alá helyezett 20,66 hektárt egy szőlőültetvény területén a Veliko Tarnovo régióban. Körülöttük körülbelül 140 hektáros pufferzónát hoztak létre egy év időtartamra. A veszélyes fitoplazmás betegség (*Grapevine flavescence dorée*) - a szőlő arany sárgulásának kórokozója - miatt hozták meg a lépést. A kórokozó jelenlétét a BFSA Központi Növénykarantén Laboratóriumában molekuláris vizsgálattal erősítették meg egy kutatóintézet és a ültetvény tulajdonosának bejelentése után.

A betegség fertőző ültetési anyagon és egy vektor (hordozó) - az amerikai szőlőcincér (*Scaphoideus titanus*) - révén terjed, amely a szőlő nedvével táplálkozik és átviheti a kórokozót

fertőzött egészséges növényekre.

Létrehoztak egy szervezetet az azonosított járvány kiirtására.

A következő év során a terület szőlőültetvényeinek teljes felméréseit fogják elvégezni, mintákat vesznek, laboratóriumi elemzéseket végeznek, és monitorozzák a betegségvektor jelenlétét. A lépések célja a betegség időben történő megállítása és az ország szőlőtermesztési ágazatának védelme.

A betegséget Európa egyik legveszélyesebb szőlőbetegségének tartják. Akár 50 százalékos terméseszkökenéshez és a szőlőtőkék fokozatos kiszáradásához vezethet. A magas fertőzési kockázat miatt a fitoplazma karantén kártevőként szerepel az Európai Unióban, és szigorú fitoszanitárius ellenőrzés alá esik.

A Szőlő (Vitis nemzetség) Kártevőinek Megelőzésére és Ellenőrzésére Irányuló Nemzeti Intézkedési Program különös figyelmet fordít a "vektorokra" - azokra a szervezetekre, amelyek átviszik és terjesztik a növénybetegségek kórokozóit (vírusos, fitoplazmás), mint például az amerikai szőlőcincér (Scaphoideus titanus), a Flavescence dorée fitoplazma-PHYP64 vektora, a szőlő arany sárgulásának kórokozója. A fitoplazma szerepel a 2019/2072/EU végrehajtási rendelet II. mellékletében, az "Uniós karantén kártevők és azok megfelelő kódjainak listájában"; B. rész - "Az Unió területén előforduló ismert kártevők". A fitoplazma vektora, az amerikai szőlőcincér megtelepedett Bulgária területén. Néhány európai ország (Franciaország) már alkalmaz kötelező rovarirtó kezelési vagy szőlőtőkék szanitárius kiirtási programokat, amelyek célja a szőlő arany sárgulásának (Flavescence dorée fitoplazma) terjedésének korlátozása.



Amerikai szőlőcincér (Scaphoideus titanus) – imágó

Az amerikai szőlőcincér (*Scaphoideus titanus*) lárvái és imágói a Flavescence dorée fitoplazmát fertőzött növények leveleinek elfogyasztása során szerzik meg. A szerzés utáni lappangási idő 4-5 hét, ezután a cincér élete hátralevő részében átviszi a Flavescence dorée-t. A faj évente egy nemzedéket fejleszt, és peteként telel át a vesszőkben. A lárvák áprilisban kelnek ki. A levelekből és a vesszők fiatal zöld hajtáscsúcsairól táplálkoznak (nedvet szívnak).

Az imágók júliusban jelennek meg. A párzás augusztusban történik, a peték rakása a vesszőkbe szeptemberben.

Május elejétől június végéig (meteorológiai viszonyoktól függően) szőlőültetvények ellenőrzéseit végeznek a *Scaphoideus titanus* lárváinak keresésére. Szárnyatlanok és ugrók. Az ürülék lárvabőröket a levelek fonákján találhatjuk meg. Nagyítót használnak az ellenőrzés során.

A sárga ragadó csapdák kihelyezésének időszaka – július elejétől szeptember végéig. A csapdákat két hetente állítják fel és ellenőrzik, azaz három hónap alatt hat alkalommal történik felállítás és ellenőrzés.

További információk a témában:

A Szőlő (Vitis nemzetség) Kártevőinek Megelőzésére és Ellenőrzésére Irányuló Nemzeti Intézkedési Program - fontos útmutató minden szőlőtermesztő és szakagronómus számára