

A búzanövények állapota a szadovói régióban

Автор(и): доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово; доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово

Дата: 14.03.2026 *Брой:* 3/2026



Dél-Bulgáriában, március közepén a gabonanövények sikeresen átteleltek, és nem figyeltek meg fagyásos károsodásra vagy alacsony hőmérsékleti sérülésre utaló feltételeket. A jelen pillanatban (2026.03.12.) a szadovói régió búzavetéseinek fitoszani-tári állapota jó. A búza a szárhajtás stádiumában van, amely normális körülmények között és kellő talajnedvesség mellett zajlik. Az árpában tápanyaghiány miatt sárgulásos eseteket figyelnek meg.



Betegségek és kártevők egyes előfordulásait rögzítik. Az átlagos napi hőmérsékletek emelkedésével a következő betegségek megjelenése és elterjedése várható: levélfoltosság (Septoria), lisztharmat és barna rozsda. Ezek a kórokozók évente előfordulnak Szadovo búzavetéseiben, és különös figyelmet kell fordítani rájuk az optimális hozam elérése érdekében. A gazdasági küszöböt meghaladó kártevők megjelenésére is folytatnak monitoringot. A legtöbb gazdálkodó számára a növények tavaszi műtrágyázása már megtörtént vagy éppen folyamatban van.



A jelenlegi agrometeorológiai feltételek stabilak, és előfeltételei vannak a korai tavaszi növények (borsó, búkköny, tavaszi árpa) vetésére szánt területek minőségi vetés előtti talajművelésének. A talajok jól ellátottak nedvességgel. Reméljük, hogy március végén és április elején nem lesz késői fagy, amely negatívan befolyásolhatja a hozamkomponensek kialakulását.