Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

Októberben: Milyenek lesznek az agrometeorológiai feltételek, és mikor vannak az optimális vetési időpontok?

Растителна Защита

Dátum 09.10.2026 | **Szám** 10/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Nyelv** HU
www.plant-protection.com/article/2478?lang=hu



Október első tíz napjában az agrometeorológiai viszonyokat instabil időjárás és az éghajlati normák körüli és az alatti átlagos napi hőmérsékletek határozzák meg. Az időszak legtöbb napjára előrejelzett hűvös és csapadékos időjárás előfeltétele lesz a kórokozók fejlődésének – a gyümölcsfák őszi fajtáinak termésén megjelenő késői barnagyümölcsrothadás (Monilia fructigena), a szürkepenész (Botrytis cinerea) a le nem szüretelt szőlőtermésen. A tíz napos időszak végén tömeges fagyok várhatók, ami a fagyra érzékeny zöldségnövények időben történő betakarítását teszi szükségessé.



Késői barnagyümölcsrothadás a gyümölcsfák őszi fajtáinak termésén (Monilia fructigena)

Október első tíz napjában csapadék, a felső talajrétegek állapotának és a szezonális talajművelés elvégzésének feltételeinek javulása várható. A nyár végi aszály hátráltatta az őszi vetésre szánt területek ve-

tés előtti talajművelését. Emiatt elmaradtak az őszi repce vetésének szeptemberi agrotechnikai határidői.



Az október az őszi gabonafélék vetésének optimális időszaka. Az első tíz napban van a búza vetésének agrotechnikai határideje Észak-Bulgáriában, október 15. és 25. között – Dél-Bulgáriában, a hónap végén pedig – a Fekete-tenger partvidékén fekvő területeken.

Az agrometeorológiai viszonyok az október 9-16. közötti időszakban dinamikusak lesznek. E hétnapos időszak elején az előrejelzett átlagos napi hőmérsékletek a normál felett alakulnak, a hátralévő részében pedig az éghajlati normákon belül maradnak. Az időszak elején helyi és gyenge csapadék várható Nyugat-Bulgáriában, az időszak közepe felé pedig Közép- és Kelet-Bulgária síkvidéki területein is. Helyenként a mennyiségek jelentősek lesznek, ami javítja a felső talajrétegek nedvességtartalmát. Fagyok kialakulásának feltételei nem várhatók.

Nyugat-Bulgária egyes területeinek kivételével az előrejelzési időszak első felében az agrometeorológiai viszonyok alkalmasak lesznek a szőlő- és gyümölcsültetvények végső betakarítására, a területek kapásnövényektől és kései zöldségektől való megtisztítására, valamint a takarmány- és cukorrépa betakarítására, amelyek a technológiai érettség fázisában vannak. A viszonyok alkalmasak lesznek az őszi gabonafélék vetésével kapcsolatos agrotechnikai tevékenységek elvégzésére. A területek erős gyomfertőzöttsége esetén tanácsos a gyomirtó szerek őszi kijuttatása.



Az időszak közepéig az agrometeorológiai viszonyok lehetővé teszik ásványi és szerves trágyák kijuttatását, valamint a hagyma téli előtti telepítését zöldhagymaként, a téli fokhagyma, a saláta és a spenót telepítését.

Az előrejelzési időszak második felében várható esőzések nagymértékben korlátozzák a mezőgazdasági tevékenységek elvégzésének lehetőségeit.

A második és harmadik tíz napos időszakban az agrometeorológiai viszonyokat a szokásoshoz közeli hőmérsékletek határozzák meg. A második tíz napos időszak első felében, a harmadik időszak elején és a hónap végén várható csapadék javítja a talajnedvesség-tartalékokat az 50 cm-es rétegben és az elvetett őszi növények vegetációjának kezdeti fázisai lefolyásának feltételeit. Október végén a búzában és az árvában, a vetés időpontjától függően, a kelés és az 1-2-3 leveles fázisok kialakulása figyelhető meg.



Októberben az őszi növényeket kártevők támadják meg. Az őszi gabonafélékben figyelemmel kell kísérni a közönséges pocok, a búzafutóka és a búzalégy jelenlétét. Amikor a kártevők száma meghaladja a gazdasági kárküszöböt (GKK), időben történő kezelés

ISSN 2815-522X

szükséges. A közönséges pocok esetében a GKK 2 aktív kolónia dekáronként, a közönséges búzafutóka esetében – 3 lárva/m².