Растителна защита

електронно списание за растителна защита
семена, торове и земеделие
ISSN 2815-522X

A november második felében az agrometeorológiai feltételek lehetővé teszik az őszi vetések befejezését, a gyümölcsfák telepítését és a növényegészségügyi tevékenységek elvégzését a gyümölcsösökben.

Растителна Защита

Dátum 13.12.2026 | **Szám** 12/2026 | **ISSN** 2815-522X | **Nyelv** HU
www.plant-protection.com/article/2491?lang=hu



November első felének legtöbb napján az agrometeorológiai viszonyokat instabil és évszakhoz képest hideg időjárás határozza meg. Ebben az időszakban az átlagot meghaladó csapadék várható, ami az ország számos részén késlelteti a búza és az árpa vetését. Az ősz eleji aszály akadályozta a területek vetés előtti talajművelését, és emiatt a szántóföldi régiók nagy részén elmaradtak az őszi kalászos növények vetésére októberben előírt agrotechnikai határidők.

November közepéig az elvetett őszi növények fejlődése lassult ütemben halad. A magasan fekvő szántóföldeken, ahol a hónap elején csapadék, többek között hó sem kizárt, az átlagos napi hőmérséklet előre jelzett értékei közel lesznek az őszi kalászos növények vegetációjához szükséges biológiai minimumhoz.

Az időszak elején és végén (2026.11.13–19.) várható csapadék magasan tartja a felső talajrétegek nedvességtartalmát, ami tovább késlelteti a szezonális agrotechnikai intézkedéseket, amelyek közül a legfontosabb a búza vetésének befejezése. November első tíz napjában a csapadék az ország számos részén meghaladta a 60–70 l/m²-t, és élesen megnövelte a mélyebb talajrétegek nedvességtartalékait is. A Dunasíkság egy részén, a keleti és déli régiókban (agrometeorológiai állomások: Novachene, Nikolaevo, Silistra, Dolni Chiflik, Plovdiv, Haskovo, Yambol, Karnobat) az 50 és 100 cm-es talajréteg nedvességtartalékai a szántóföldi vízkapacitás (FC) 80%-át meghaladó szinteket értek el.

November második felében a hőmérséklet emelkedése és az agrometeorológiai viszonyok kedvező változása várható. Ebben az időszakban az őszi növények vegetációs folyamatai az éghajlati normákhoz közeli hőmérsékleten és jó talajnedvesség-tartalékok mellett zajlanak majd. November végén a búzánál és az árpánál a vetés időpontjától függően különböző

fenológiai fázisok figyelhetők meg. A kelés és a kezdeti levélképződés fázisa a későn, novemberben vetett növényeknél következik be.



Az októberben vetett őszi kalászos növényeknél a harmadik levél fázisa lesz a meghatározó (Bazovets, Silistra, Provadia, Karnobat). A hónap folyamán a mezőgazdasági növények kritikus minimumhőmérsékletei nem várhatók.



November második felében jelentős csapadék nem várható, és a viszonyok lehetővé teszik az őszi vetések befejezését, a gyümölcsfák telepítését és a gyümölcsösökben végzendő növény-egészségügyi tevékenységek elvégzését.



A hónap folyamán folytatni kell az őszi növények kártevők szempontjából történő megfigyelését. Október végén a közönséges pocok megnövekedett populációját állapították meg, és novemberben, ha a kártevő populációja meghaladja a gazdasági küszöbértéket (több mint 2 aktív telepített kotorék dekáronként), a területeket az engedélyezett rodenticidekkel kell kezelni.