

Kritikus minimum hőmérsékletek gyümölcsültetvények számára április első felében

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.04.2017 Брой: 4/2017



A hónap elején megnövekedett valószínűséget jeleznek a negatív minimumhőmérsékletek és a kritikus értékek (mínusz 2°C alatt) a gyümölcsfák virágzása és terméskötődése szempontjából. Ebben az időszakban a téli gabonanövények a szárhajtás kezdeti szakaszába lépnek. A sikeresen áttelelt téli repceállományokban a rügyfakadás szakasza zajlik le.

Április elején a mezőgazdasági meteorológiai viszonyokat viszonylag száraz időjárás fogja meghatározni. A feltételek megfelelőek lesznek az évszakos agrotechnikai tevékenységek végrehajtásához, amelyek közül a

legfontosabb a napraforgó vetése. Dél-Bulgária számos területén a napraforgó vetésének optimális időszakai, március második felében, már elmúltak. Észak-Bulgária számára ezek az időszakok április első tíz napjára esnek.

Az első tíz napos időszak alatt a mezőgazdasági növények vegetációja mérsékelt ütemben fog folyni, az átlagos napi hőmérsékletek a klimatikus normákhoz közeliak lesznek. A hónap elején megnövekedett valószínűséget jeleznek a negatív minimumhőmérsékletek és a kritikus értékek (mínusz 2°C alatt) a gyümölcsfák virágzása és terméskötődése szempontjából. Ebben az időszakban a téli gabonanövények a szárhajtás kezdeti szakaszába lépnek. A sikeresen áttelelt téli repceállományokban a rügyfakadás szakasza zajlik le.

A második tíz napos időszak első felében jelentős hőmérséklet-emelkedésre és az őszi vetésű növények és a többéves ültetvények gyorsult fejlődésére számíthatunk. Április közepéig a búza és az árpa túlnyomórészt a szárhajtás szakaszában lesz. Az időszak végén a repceállományok egy részében a virágzás kezdeti szakasza figyelhető meg. A március végén vetett napraforgóban a kelés szakasza lesz túlnyomó.

A következő időszakban a várt csapadék nedvességet biztosít az őszi vetésű növények, valamint a korai és középkorai tavaszi növények vegetációjának normális lefolyásához. Tavasz elején a talaj nedvességtartaléka az 50 cm-es és 100 cm-es rétegekben az ország nagy részében nagyon jó, a teljes víztartó képesség (TVK) 90%-a felett van. Kivételek a Duna-síkság egyes területein (Kneja, Novachene agrometeorológiai állomások) és az Al-Balkán völgyeiben (Kazanlak), ahol a nedvességtartalék szintje alacsonyabb (a TVK 80%-a alatt).

Az időszak alatt kedvezőbb feltételek alakulnak ki a növényvédő permetezések végrehajtásához egyes gazdaságilag jelentős betegségek (virágrothadás, barack levélhajlító, lyukasfoltosság, varasodás, birs terméslehullás stb.) és kártevők (levélaknázók, levéltetvek, molyok, ormányosok stb.) ellen április első tíz napjának elején és végén, valamint a második tíz napos időszak közepén.

Forrás: NIMH-BAS