

Május első felében kedvezőek lesznek a körülmények számos gombabetegség fertőzési hátterének kialakulására a mezőgazdasági növényekben.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.05.2017 Брой: 5/2017



A május eleji gyakori, helyenként intenzív csapadék előfeltétele lesz számos gombás betegség fertőzési nyomásának növekedésének: a búzában és az árpadban a fusariózisnak és a rozsdáknak (sárga, barna); a zöldségfélékben a lisztharmatnak; a gyümölcsfákban a varasodásnak és a lyukszembetegségnek; a szőlőben a lisztharmatnak és a peronoszpórának.

Május első tíz napjában az agrometeorológiai feltételeket instabil időjárás, gyakori záporok határozzák meg, ami az ország számos részében hátráltatja a szezonális agrotechnikai tevékenységek végrehajtását – a termesztett

kukorica vetésének befejezését, a késői, hőigényes tavaszi növények – bab, gyapot, földimogyoró, görögdinnye, sárgadinnye stb. – elővetéses talajművelését és vetését.

Ebben az időszakban az őszi vetésű állományok és a vetett tavaszi növények fejlődése a klimatikus normákhoz közepes napi hőmérsékletek mellett, valamint a 50 cm-es rétegben a teljes vízkapacitás (TVK) 85%-át meghaladó jó talajnedvesség-tartalék jelenlétében fog zajlani. A tíz napos időszak alatt az ország síkvidéki régióiban a búzában és az árpában tömegesen figyelhető meg a füzéresedés, Dél-Bulgária egyes helyein pedig a virágzás kezdete.

Az első tíz nap végén és a második tíz nap elején hőmérséklet-emelkedés és a mezőgazdasági növények vegetációjának felgyorsulása várható. Május közepéig a téli gabonanövényeknél virágzás és megtermékenyítés, a kukoricában és a napraforgóban pedig levélképződés megy végbe. A korai tavaszi növényekben (borsó, búkköny) a rügyezés és virágzás figyelhető meg.

Az április fagyai által nem érintett gyümölcstermő növényekben a terméskötődés kialakulása és növekedése zajlik. A szőlőben a virágzat kibújás figyelhető meg.

A május eleji gyakori, helyenként intenzív csapadék előfeltétele lesz számos gombás betegség fertőzési nyomásának növekedésének: a búzában és az árpában a fusariózisnak és a rozsdáknak (sárga, barna); a zöldségfélékben a lisztharmatnak; a gyümölcsfákban a varasodásnak és a lyukszembetegségnek; a szőlőben a lisztharmatnak és a peronoszpórának. A növényvédő permetezések végrehajtására kedvezőbb feltételek az első tíz nap végén és a második tíz nap első felében állnak elő.

Május közepéig nem várhatók kritikus minimumhőmérsékletek a mezőgazdasági növények számára. Az első tíz napos időszakban fokozott jégesőveszély várható. Jégkár esetén célszerű az érintett növényállományt első adandó alkalommal réztartalmú gombaölő szerekkel kezelni a sebek gyorsabb gyógyulása és a másodlagos fertőzések kockázatának csökkentése érdekében.

Forrás: NIMH-BAN