

Szőlő növényvédelmi gondozása májusban

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 14.05.2017 Брой: 5/2017



Ebben az időszakban a szőlőtőkék a „virágzatok első megjelenése” és a „teljes virágzás” fenofázisban vannak.

A periódus fő kártevői

Szőlő lisztharmat *Plasmopara viticola*

Szőlő lisztpenész *Oidium tuckeri*

Szürke penész *Botrytis cinerea*

Szőlő mirigygubacsatka *Eriophyes vitis*

Szőlőmoly *Lobesia botrana*

Közönséges szőlőlevéltekerő *Sparganothis pilleriana*

Szőlő sodróormányos *Byctiscus betulae*

Szelíd szőlőpajzstetű *Pulvinaria vitis*

Sárga szőlőatka *Schizotetranychus viticola*

● Szőlő lisztharmat

A lisztharmat a levelek korától függően kétféle foltot képez: olajos és mozaikos. Ezek fonákján fehér spóratermő bevonat képződik. Erős fertőzés esetén a levelek kiszáradnak és korán lehullanak. Kedvező körülmények között (75% feletti relatív páratartalom) a virágzatokon és a fűtőkön is klorotikus foltok jelennek meg, amelyeken szintén fehér bevonat fejlődik. Ha a foltok a fűtő tövéénél helyezkednek el, az egész fűtő kiszárad. A bogyók fertőzése abban a méretben áll le, amikor a borászati fajtáknál „borsó”, asztali fajtáknál pedig „bab” nagyságúak lesznek.

Védekezési stratégia:

A kezeléseket akkor kell végezni, amikor kedvező fertőzési feltételek állnak fenn (13°C feletti levegőhőmérséklet és gyakori, de enyhe csapadék) és a szőlő érzékeny fenofázisában van: „virágzás” – „borsónagyságú bogyó”.

Engedélyezett növényvédő szerek:

acrobat r – 0,25%; acrobat plus wg – 200 g/ha; axanit-cu wp – 0,25%; alial 80 wg - 75-330 g/ha; alfil wg - 0,075-0,33 kg/ha; alfil wp - 0,075-0,33 kg/ha; alfil duplo - 90-350 g/ha; amalin flo - 280 ml/ha; antracol 70 wg – 0,15%; armetil m – 0,25%; armetil-s wp – 0,25%; banko 500 – 0,2%; bordeaux mix 20 wp – 0,5-0,6%; valbon - 180-200 / ha; verita wg – 0,2%; winker wg – 200 g/ha; vitene triplo r - 400 -450 g/ha; vitra 50 wp /cuprohy 50 wp – 0,15%; galben 8 m 65 – 0,25%; delan 700 wdg – 0,05%; dimix 500 sc - 34 ml/ha folpet tartalmú szerekkel tartálykeverékben alkalmazva; dimix 500 sc - 30 ml/ha mankoceb tartalmú szerekkel tartálykeverékben alkalmazva; ditan dg - 200 g/ha; ditan m-45 - 200 g/ha; drago 76 wp – 0,16%; enervin – 0,2%; cabrio top – 0,15%- kezelési időköz 7-10 nap - 0,2% 10-14 naponként; katanga express - 75-330 g/ha; katanga man - 300-500 g/100 l víz; corseyt r df – 0,25%; corseyt r wp – 0,25% 2017.09-ig; corseyt max wp – 0,15%; quadris 25 sc – 0,075%; cupertine m – 0,3%; cuproxat fl / tribase flowable – 0,3% 2017.06-ig; cuproset gold m – 0,15%; cuprocin super m – 0,2%; lieto - 40-45 g/ha; mancozeb 80 wp – 0,3%; manfil 80 wp - 200 g/ha; manfil 75 wg - 210 g/ha; medeiro 80 wg- 75-330 g/ha; réz-oxiklorid 50 wp – 0,25%; medyan extra 350 sc - 350 ml/ha; melody compact 49 wg - 150 -175 g/ha 2017.06-ig; mycal flash – 0,3%; mildicut - 350-450 ml/ha; moximat 505 wg - 240-300 g/ha; moximat 505 wp - 240 – 300 g/ha; momentum extra wg - 300 g/ha; pasodoble 70 wg - 200 g/ha; pencozeb 80 wp - 200 g/ha ; pencozeb 75 wg - 210 g/ha; pergado copper 27 wg - 500 g/ha; pergado f 45 wg –

0,2%; profiler 71.1 wg- 200-225 g/ha; ridomil gold mz 68 wg – 0,25%; rumba 35 sc – 0,35%; sankozeб 80 wp - 200 g/ha; instar - 70-80 ml/ha; solofol - 188 g/ha; strobi df /discus df - 0,015 % + acrobat mz - 0,15 %; sphinx extra /vinostar - 180 g/ha; folder 80 wg - 150 g/ha ; follow 80 wg/ friller 80 wg/ flowet 80 wg - 187,5 g/ha; folpan 80 wdg - 0,15 % - 0,1 % + ardent 50 sc - 0,015 %; funguran oh 50 wp – 0,15%; shavit f 72 wdg – 0,2%; champion wp/ macc 50 wp /champ wp – 0,155.

• Szőlő sodróormányos

A bogarak május elején jelennek meg. Rügyekkel, virágokkal és levelekkel táplálkoznak. A nőtények több fiatal levél levélnyelét átrágják és megszakítják a hozzájuk vezető nedvvezetékét, majd szivar alakba csavarják őket egy központi levél köré, amelynek nyelét nem rágják át, és ebbe több petét raknak. A központi levél viszonylag friss marad és később szárad ki, a kikelő lárvák pedig ezzel táplálkoznak.

Védekezési stratégia:

A populáció sűrűségének növekedése esetén a petezés előtt kell kezelni a kifejlett bogarakat.

Engedélyezett növényvédő szer:

deca ec/ desha ec/ dena ec - 40 - 60 ml/ha;

A periódus betegségeinek és kártevőinek részletes leírása és védekezése megtalálható a „Növényvédelem” folyóirat 2017/5-ös számában.