

Veszélyes kártevő "pusztítja" a puszpángot

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.05.2017 Брой: 5/2017



Ha azt veszi észre, hogy a puszpáng meg sárgul, akkor kétségtelenül komoly problémával áll szemben. Megfertőzte a puszpángmoly (Cydalima perspectalis). Ez a kelet-ázsiai eredetű veszélyes kártevő 2007-ben érkezett Európába, és nagyon gyorsan megtelepedett számos országban – Olaszországban, Oroszországban, Csehországban, Magyarországon, Svájcban, Ausztriában, Belgiumban, Romániában, Szlovéniában, Szlovákiában, Franciaországban, Törökországban és az Egyesült Királyságban, Bulgáriát is beleértve.

Ültetési anyaggal terjed, de még ha a puszpángja már régóta az udvarában van, az sem garancia arra, hogy ezt a kártevőt nem "látogatja meg". Ennek az az oka, hogy a moly képes nagy távolságokat repülni – 10 km sem akadály számára. Úgy vélik, hogy az internetes ültetési anyag kereskedelem az egyik útja a kártevő Európába való behurcolásának.

A kártevő egy moly, általában fehér, fényes, sötétbarna csíkkal a szárnyak szélén. A szárnyak széttárva a mérete 4 cm. A lárvák világoszöldek, jellegzetes fekete rajzolattal fehér foltokkal, kis szőrökkel és fényes fekete fejjel.

A kárt a lárva okozza. A puszpáng leveleit eszi, kezdetben a széleket, később teljesen elpusztítja azokat. Eleinte a kár foltokként látható a leveleken. A fiatal lárvák felismerése meglehetősen nehéz, mivel a levelek között táplálkoznak. Ezért szükséges szétnyitni a bokrokat és a lárvákat a közepükben keresni. A harmadik lárvastádium után a puszpáng felső részén lévő levelekre is átköltöznek, és könnyebben észrevehetők. A bábokat nehéz felismerni (eleinte világoszöldek), mert a levelek között rejtőznek. A petéket csomókban rakja le, 1–3 mm méretűek, és áttetsző, fehéres-sárgás membrán borítja őket. Nappal a molylepkék a puszpángban vagy annak közelében lévő növényekben rejtőznek.

Mechanikus védekezés

Hatékony védekezési módszer a lárvák kézi összegyűjtése, amelyet 2–3 naponként kell végezni. Nagyobb ültetvényeknél: fasoroknál, parkoknál porszívó is használható. A puszpángmoly vonzza az ultraibolya lámpák – azok, amelyeket a kertekben a szúnyogok ellen helyeznek el.

Vegyi védekezés

A kontakt rovarölő szerek (Decis 100 EC) használata hatékony, de nem alkalmas közparkokban és kertekben. A *Bacillus thuringiensis* var. kurstaki alapú bioinszekticidek jó hatékonyságúak és környezetbarátok. Kipróbálhatja a Prev-Gold-ot (narancsolaj) is, amely alkalmas az ökológiai gazdálkodásra.