

Júniusban a meteorológiai feltételek kedvezőek lesznek a gombabetegségek kialakulására.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.06.2017 Брой: 6/2017



Júniusban a meteorológiai feltételek kedvezőek lesznek számos gombabetegség fejlődéséhez: szőlő és zöldségnövények lisztharmatja, a kései cseresznyefajták termésének késői barna rothadása, gyümölcsrepedés a gyümölcsösökben stb. A növényvédő permetezések végrehajtására alkalmasabb feltételek a hónap első évtizedének elején, a második évtized második felében, valamint a harmadik évtized napjain többségén állnak majd elő. A hónap során a várt maximumhőmérsékletek, körülbelül 34-35°C körül, kedvezőtlenül hatnak majd a zöldségnövények virágzására és termékenyülésére.

Június elején a mezőgazdasági növények fejlődése felgyorsult ütemben fog zajlani, a normál feletti hőmérsékletek mellett, és az ország nagy részén jó és nagyon jó talajnedvesség-tartalékokkal, ami a május harmadik évtizedében lezajlott jelentős csapadékmennyiségek (Vraca – 57 l/m², Lovecs – 41 l/m², Pleven - 106 l/m², Veliko Tarnovo - 74 l/m², Szvisztov – 68 l/m², Ruszé – 51 l/m², Szilisztra – 48 l/m²) következménye. Kivételt

csak a déli és délkeleti régiók egyes elszigetelt helyein figyelhetünk meg, ahol a csapadék nem volt különösebb gazdasági jelentőségű, 10 l/m² alatt maradt.

Az első évtized közepére hőmérséklet-csökkenés és -normalizálódás, valamint agrometeorológiai feltételek változása várható. Az első évtized végéig várható csapadék a talaj nedvességtartalékát a tavaszi növények vegetációjára optimális tartományokon belül fogja tartani. Kedvező hatással lesz a téli gabonanövényekre is a magasabban fekvő területeken, ahol a szemtöltés zajlik majd. A búzánál az ország alföldi régióiban a tejérettség fázisa figyelhető meg. Az árpa esetében a tejérettségből a viaszérettségbe, majd a viaszérettségbe való átmenet zajlik. Az első évtizedben a repce be fog lépni az érési szakaszba. Ebben az időszakban megnövekedett jégverés valószínűség várható, a növények fekvése és a mezőgazdasági növények további károsodása veszélyeztetve. Jégkár esetén ajánlott az érintett zöldség- és gyümölcstermő növényeket első adandó alkalommal megfelelő (réztartalmú) gombaölő szerekkel kezelni.

A második és harmadik évtized napjain többségén a mezőgazdasági növények fejlődése a normához közeli hőmérsékletek mellett fog zajlani. A második évtized elején a szántóföldi területeken az árpa túlnyomórészt a tömeges érés szakaszában lesz. Az évtized végén a búza túlnyomórészt a viaszérettség fázisában lesz.

Június végéig a tavaszi növények egy része reproduktív fejlődési szakaszaiba lép: a napraforgónál a virágzás kezdete figyelhető meg, a korai hibrid kukoricáknál pedig a virágzat kifejlődése és virágzása. A hónap során a várt maximumhőmérsékletek, körülbelül 34-35°C körül, kedvezőtlenül hatnak majd a zöldségnövények virágzására és termékenyülésére.

Forrás: OMSZ - BTA