

Növényvédelmi teendők júniusban szőlőültetvényekben

Автор(и): гл.експерт Татяна Величкова, Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига", ЦОРХВ

Дата: 13.06.2017 Брой: 6/2017



Ebben az időszakban a szőlő a "teljes virágzás" fenofázisától a "borsószem-nagyságú bogyó" - "fürtzáródás" fenofázisig tart.

A periódus fő kártevői

Szőlő lisztharmat *Plasmopara viticola*

Szőlő lisztesödény *Oidium tuckeri*

Szürke penész *Botrytis cinerea*

Szőlőmoly *Lobesia botrana*

Szőlőpajzstetű *Pulvinaria vitis*

Sárga szőlőatka *Schizotetranychus viticola*

Szürke penész

A "teljes virágzás" fenofázisban barna foltok képződnek a virágokon és a virágkocsányokon, amelyeket a kórokozó spórái borítanak. Ezeket a tüneteket korai szürke penészként ismerjük.

Kártevőirtási stratégia: Esős és meleg időben, közvetlenül a virágzás után, az első bogyók megjelenésekor és a fűtzáródáskor permetezést kell végezni az egyik bejegyzett növényvédő szerrel.

Engedélyezett növényvédő szerek: arvak 50 WG - 100-150 g/ha; geox WG - 100 g/ha; driza WG - 100-150 g/ha; cabrio top – 0.2%; cantus - 100 g/ha; mevalon - 160-400 ml/ha; proletus 50 WG - 120 g/ha; rebut WG - 100-150 g/ha; sabueso - 100-150 g/ha; synpro - 150 ml/ha; switch 62.5 WG - 0.08%; thiram 80 WG – 0.4%; top plus 70 WP – 0.1%; topsin M 70 WDG – 0.1%; folder 80 WG - 150 g/ha; follow 80 WG / friller 80 WG / flowet 80 WG - 187.5 g/ha; folpan 80 WDG - 0.1 % + ardent 50 SC - 0.015 %; shavit F 72 WDG – 0.2%.

Szőlőmoly

Júniusban repül a kártevő második generációjának lepkéje. Petéiket borsónyi (első) bogyókra rakják. A lárvák károsítják az első bogyókat, kifalva és megrágva azok belsejét a magvakkal együtt. A károsított bogyók gyengén selyemszálakkal kötődnek össze. Egy lárva 7-24 bogyót károsít.

Kártevőirtási stratégia: A kezeléseket az **ETL** értéknél kell elvégezni: asztali szőlőfajtáknál 6-7 lárva 100 első bogyónként, borászati szőlőfajtáknál pedig 11-12 lárva 100 első bogyónként.

Engedélyezett növényvédő szerek: aficar 100 EC – 40 ml/ha; dascor 440 - 50 ml/ha; decis 100 EC - 12.5-17.5 ml/ha; dipel 2 X - 0.1 %; dukat 25 EC - 70 ml/ha; efcimetrin 10 EC / cyper 10 - 40 ml/ha; karate zeon 5 CS – 0.02%; coragen 20 SC - 18 ml/ha; luzindo 40 WG - 0.025 kg/ha; mageos - 10 g/ha; maltoato - 40-60 ml/ha; nexcid 015 CS - 0.03 %; nurelle D / chlorsirin 550 EC / samba - 60 ml/ha; runner 240 SC - 0.04 %; rapax - 75-

100 ml/ha; reldan 40 EC - 0.12 %; sineis 480 SC - 4-18 ml/ha; sumi alpha 5 EC / sumicidin 5 EC - 0.025 %;
forey 48 B - 0.15 %; fury 10 EC - 0.0125 %; ciklon 10 EC - 40 ml/ha; cyperfor 100 EC - 40 ml/ha; citrin max /
cyperkyl 500 EC / cypert 500 EC / poli 500 EC - 6 ml/ha; sherpa 100 EW / aficar 100 / cyperfor 100 EW / ciklon
100 EW - 25 ml/ha; sherpa 100 EC - 40 ml/ha.