

"Idő a betakarításra"

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.07.2017 Брой: 7/2017



A júniusi hőhullámok után július első tíz napjában a hőmérsékleti viszonyok normalizálódására számíthatunk. A hónap elején várt csapadék javítani fogja a tavaszi növények vegetációjának feltételeit, amelyek nagy része fejlődése reprodukív fázisaiba lép. A hónap folyamán a várt rendkívül magas, 38-42°C közötti maximumhőmérsékletek az alacsony légköri páratartalommal kombinálva kedvezőtlenül hatnak a napraforgó, a kukorica és a zöldségfélék (paradicsom, uborka, paprika, cukkini) virágzására és termékenyülésére.

Júliusban a mezőgazdasági növények fejlődése a klímánorma körüli vagy azt meghaladó hőmérsékletek mellett, és a síkvidéki területek számos helyén – talajnedvesség-hiányos körülmények között fog zajlani. **A hónap napjainak nagy részére várt száraz időjárás megfelelő öntözési rend alkalmazását teszi szükségessé a**

tavaszi növényeknél, fokozott öntözési normákkal az ország északnyugati és déli régióiban, ahol a nyár elején a 50 cm-es réteg talajnedvesség-készlete alacsony - a mezővízkapacitás (MVK) 50-55%-a alatti.

A júniusi hőhullámok után július első tíz napjában a hőmérsékleti viszonyok normalizálódására számíthatunk. A hónap elején várt csapadék javítani fogja a tavaszi növények vegetációjának feltételeit, amelyek nagy része fejlődése reprodukív fázisaiba lép.

Az első és második tíz napos időszakban a kukoricában a következő fejlődési fázisok következnek be: a fásülés kifejlődése, a fásülés virágzása és a selyemszálak megjelenése. A harmadik tíz napos időszakban a vetésterületek egy részén a korai kukoricahibridek a tejérlelési stádiumba lépnek.

Júliusban a napraforgó virágzási, termékenyülési és szemtöltési fázison megy keresztül. A hónap végén a Duna-menti síkság, valamint a legkeletibb és legdélebbi régiók egyes állományainál megfigyelhető lesz az érlelődés kezdete. A harmadik tíz napos időszakban a síkvidéki területeken a szemesbab befejezi fejlődését.

A hónap folyamán a várt rendkívül magas, 38-42°C közötti maximumhőmérsékletek az alacsony légköri páratartalommal kombinálva kedvezőtlenül hatnak a napraforgó, a kukorica és a zöldségfélék (paradicsom, uborka, paprika, cukkini) virágzására és termékenyülésére.

Július agrometeorológiai viszonyai korlátozni fogják számos gombabetegség terjedését a mezőgazdasági növényekben, a lisztharmat kivételével. A száraz és meleg időjárás előfeltétele lehet egyes kártevők - atkák - egyedszámának növekedésének. A gyümölcsösökben nem szabad alábecsülni a gyümölcsmoly második nemzedékének kártételét. A hónap folyamán a növényvédő permetezéseket a nap hűvösebb óráiban célszerű elvégezni. Júliusra fokozott jégesőveszélyt jeleznek. Jégkár esetén célszerű a károsított gyümölcs- és zöldségféléket a lehető legkorábbi időpontban megfelelő réztartalmú gombaölő szerekkel kezelni.

Kedvezőbb feltételek a legfontosabb szezonális munka – a búzaarató – lebonyolításához az első tíz nap közepén, a második tíz nap első felében, valamint a harmadik tíz nap napjainak nagy részén állnak elő. Jó szemtermésre számíthatunk.

Forrás: NIMH-BMTA